

Źródła finansowania

Sprawujący nadzór nad obszarem
oraz zarządzający
siecią Natura 2000
w województwie podkarpackim

PLH180053 Dolna Wisłoka z Dopływami

Zadania dotyczące opracowania Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 prowadzone są w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „**Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000**” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.

Całkowita wartość projektu:

27 885 119,16 zł

Beneficjent projektu:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

W ramach projektu w granicach woj. podkarpackiego plany zadań ochronnych zostaną ustanowione dla **19 obszarów Natura 2000**

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Al. Józefa Piłsudskiego 38

35-001 Rzeszów

Tel.: 17 785 00 44

Fax: 17 852 11 09

www.rzeszow.rdos.gov.pl

e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Wydział Spraw Terenowych I w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno


Tel./Fax: 13 437 28 31

Wydział Spraw Terenowych II w Przemyślu

Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

Tel./Fax: 16 670 15 03



Leśny odcinek potoku Chotowskiego z widocznymi meandrami koryta

Powierzchnia: 453,69 ha

Rok zatwierdzenia: 2011

Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie i Kotlina Sandomierska

Mezoregion: Pogórze Strzyżowskie, Nizina Nadwiślańska, Płaskowyż Tarnowski, Dolina Dolnej Wisłoki, Pradolina Podkarpacka

Położenie administracyjne: województwo podkarpackie, powiat mielecki, gmina Gawtuszowice, Mielec – miejska i wiejska, Przecław, powiat dębicki, gmina Żyraków, Dębica – miejska i wiejska, Pilzno, Czarna – gmina wiejska, powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Wielopole Skrzyńskie, Ostrów, Sędziszów Małopolski



Podstawowym celem ochrony w tym obszarze jest utrzymanie siedlisk wodnych oraz siedlisk nadrzecznych pozostających ze sobą w dynamicznej równowadze.



Potok Chotowski - siedlisko minoga strumieniowego i łososia

szpalerów lub niewielkich kęp, łągu topolowego – *Populatum albae*, głównie z topolą czarną.

W Wisłocie stwierdzono występowanie 32 gatunków ryb w tym z rodziny łososiowatych, karpowatych (m.in. różanka europejska – *Rhodeus amarus*), głowaczowatych (m.in. **głowacz białołetwy** – *Cottus gobio*), kozowatych, szczupakowatych, okoniowatych, sumowatych i wątluszwatych oraz **minoga strumieniowego** – *Lampetra planeri*.

Wisłoka objęta jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych, zaś jej dopływy na tym odcinku wymieniane są jako potencjalne tarliska anadromicznych ryb wędrownych – potwierdza to obecność form młodocianych łososia – *Salmo salar* i siedlisko ryb prądotłubnych.

Obszar obejmuje rzekę Wisłokę wraz z dopływami na odcinku od ujścia potoku Chotowskiego w miejscowości Chotowa do ujścia lewostronnego dopływu w miejscowości Grabiny-Dębica oraz od ujścia rzeki Wielopolka w miejscowości Pustków do rurociągu przechodzącego nad korytem rzeki w miejscowości Podleszany.

W obrębie Wisłoki, jak i jej dopływów największe powierzchnie zajmują łągi wierzbowe, zarówno w postaci dojrzałej – *Salicetum albo-fragilis*, jak i inicjalnej – *Salicetum triandro-viminalis*. Terasy Wisłoki, w znacznym stopniu porośnięte są krzewiastymi formacjami wierzb wąskolistnych, pozostających w kompleksie przestrzennym z niżowymi ziołotołami nadrzeczными i pozostałościami, często w postaci



Widok na łąg topolowy u ujścia potoku Ostra do Wisłoki