

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA****ODDZIAŁ LABORATORYJNY W SZCZECINIE  
LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII**

70-632 SZCZECIN

ul. Spedytorska 6/7

<https://www.gov.pl/web/wsse-szczecin>

1. Próbkę do badania bakteriologicznego pobiera klient, opiekun lub uprawniony pracownik medyczny.

Kał do badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella do celów sanitarno – epidemiologicznych należy pobierać w trzech możliwie kolejno po sobie następujących dniach. Dopuszcza się pobranie jednego wymazu z odbytu lub pobieranie kału na wymazówkę z podłożem transportowym.

Kał i/lub wymaz do badania w kierunku patogenów schorzeń jelitowych należy pobierać w trzech możliwie kolejno po sobie następujących dniach lub według zaleceń lekarza lub pracownika Powiatowej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej.

Jeżeli nie ma możliwości dostarczenia kału w terminach określonych poniżej można wykonać wymaz z kału. Kał pobierany jest wymazówką do próbki z podłożem transportowym umożliwiającym przechowywanie maksymalnie do 72 godzin (certyfikat producenta). W tym czasie musi być dostarczony do laboratorium.

**Nie można dopuścić do zamrożenia próbki.**

**W wymazówce musi być widoczna wyraźna grudka kału.**

2. Próbkę należy dostarczyć do Rejestracji Medycznej WSSE w Szczecinie:

Kał:

- w dniu pobrania - w przypadku próbek od osób ze styczności, chorych, nosicieli i ozdrowieńców oraz w kierunku nosicielstwa Salmonella, Shigella;
- w przypadku badań w kierunku nosicielstwa Salmonella, Shigella jeżeli próbka pobierana jest w dniu poprzedzającym jej dostarczenie do Laboratorium to musi być pobrana po godzinie 18.00 i przechowywana w temperaturze 4-8°C;

Wymaz z kału pobrany na podłoże transportowe - tylko dla badań w kierunku nosicielstwa Salmonella, Shigella oraz dla osób ze styczności, nosicieli, ozdrowieńców:

- w dniu pobrania, w ciągu 24 godzin w temperaturze otoczenia;
- po tym czasie i do 72 godzin przechowywany w temperaturze 4°C - 8°C;

Wymaz z odbytu pobrany na podłoże transportowe - tylko dla badań w kierunku nosicielstwa Salmonella, Shigella oraz dla osób ze styczności, nosicieli, ozdrowieńców:

- w dniu pobrania - dopuszcza się tylko 1 wymaz na 3 oddane próbki

Do każdej próbki kału należy załączyć **dokładnie i czytelnie** wypełnione „Skierowanie na badanie laboratoryjne”  
Załącznik nr 1 do IR/EP/PSJ/PO – 11/01.

### **3. Postępowanie w przypadku zatruc pokarmowych:**

- a) próbki dostarczane przez pracowników PSSE – kał w dniu pobrania, wymaz z odbytu, wymaz z kału;
- b) próbki dostarczane przez pacjentów do Rejestracji Medycznej WSSE w Szczecinie – kał w dniu pobrania, wymaz z kału;

### **4. Pobieranie kału:**

- próbkę kału należy pobrać ze świeżo oddanego stolca do czystego, szczelnie zamkniętego pojemnika ( tzw. „kałówki”);
- ilość kału, którą należy pobrać: około ½ pojemnika;
- na pojemniku tzw. „kałowce” należy umieścić dane: imię i nazwisko osoby badanej i datę pobrania kału;
- w przypadku pobierania na wymazówkę transportową kał należy pobrać wymazówką (widoczna duża grudka kału) i umieścić wymazówkę z próbką w podłożu transportowym – wymazówkę należy opisać imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania materiału.

### **5. Technika pobierania wymazu z odbytu:**

Do pobierania wymazu korzysta się ze środków jednorazowego użytku – wymazówki z podłożem transportowym. Osoba w pozycji skłonu do przodu lub na kozetce w pozycji łokciowo – kolanowej lub jeżeli to niemożliwe leży na boku z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych. Osoba, której pobiera się wymaz z odbytu, powinna powoli i miarowo oddychać, rozluźnić mięśnie pośladkowe i zwieracz odbytu. Wacik z podłoża transportowego wprowadzić w odbyt na głębokość 4-5 cm. Obracać wacik kilkakrotnie starając się zebrać jak najwięcej materiału. Po pobraniu materiału wymazówkę umieścić w podłożu transportowym, opisać imieniem i nazwiskiem oraz datą pobrania materiału.