



Minister
Zdrowia

PLD.4731.5.2023.AK
Warszawa, 28 lipca 2024

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA
w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury
ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Na podstawie art. 47f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niniejszy Komunikat wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty jego publikacji.

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Marek Kos
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/



Minister Zdrowia

| Lp. | Nazwa produktu leczniczego | Nazwa międzynarodowa | Postać | Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany | Kod ICD-10 | Uwagi |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|---|
| 1. | Adcetris | <i>Brentuximab vedotinum</i> | proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji | Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina | C81 | leczenie brentuksymabem vedotin w skojarzeniu z doksorubicyną, winblastyną i dakarbazyną dorosłych chorych z uprzednio nieleczonym chłoniakiem Hodgkina w III stadium zaawansowania |
| 2. | Adynovi | <i>Rurioctocogum alfa pegolum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B | D66, D67 | w populacji pacjentów <12 roku życia |
| 3. | Afinitor | <i>Everolimus</i> | tabletki | Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu | C50 | brak |
| 4. | Aimovig | <i>Erenumab</i> | roztwór do wstrzykiwań | Migrena przewlekła | G43 | brak |
| 5. | Ajovy | <i>Fremanezumab</i> | roztwór do wstrzykiwań | Migrena epizodyczna | G43 | rekomendacja dotyczyła objęcia refundacją w migrenie przewlekłej i epizodycznej; lek objęty refundacją w migrenie przewlekłej |
| 6. | Akeega | <i>Abirateronum + Niraparib</i> | tabletki powlekane | Rak gruczołu krokowego | C61 | terapia skojarzona z prednizonem lub prednizolonem u dorosłych pacjentów z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z przerzutami (mCRPC) i mutacjami genów BRCA1/2 (germinalną i/lub somatyczną), u których nie jest wskazana chemioterapia |
| 7. | Bavencio | <i>Avelumab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Leczenie raka nerki | C64 | wiek 18 lat i powyżej; histologicznie potwierdzone rozpoznanie raka nerkowokomórkowego z komponentem jasnokomórkowym; w terapii skojarzonej z aksytynibem; nowotwór w stadium zaawansowanym (obecne przerzuty odległe) lub nawrót po leczeniu chirurgicznym lub brak możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego; brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego raka nerki; |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|
| 8. | Beriner 2000 | <i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE) | D84.1 | leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE o ciężkim przebiegu z wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza się niedobór inhibitora C1-esterazy |
| 9. | Beriner 3000 | <i>Inhibitor C1-esterazy, ludzki</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy | D84.1 | leczenie zapobiegawcze pacjentów z nawracającymi napadami HAE o ciężkim przebiegu z wyłączeniem kobiet w ciąży, u których stwierdza się niedobór inhibitora C1-esterazy |
| 10. | Brineura | <i>Cerliponase alfa</i> | roztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania | Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2 | E75.4 | brak |
| 11. | Cablivi | <i>Caplacizumab</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej | M31.1 | |
| 12. | Cresemba | <i>Isavukonazolium</i> | kapsułki twarde | Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza | B44, B46 | inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B |
| 13. | Cresemba | <i>Isavukonazolium</i> | proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji | Inwazyjna aspergilloza; mukormykoza | B44, B46 | inwazyjna aspergilloza - w populacji pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie worykonazolem; mukormykoza - u pacjentów, u których nie jest wskazane leczenie amfoterycyną B |
| 14. | Elmiron | <i>Pentosan polysulfate sodium</i> | kapsułki twarde | Leczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego z glomerulacjami lub zmianami Hunnera, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego | N30.1 | brak |
| 15. | Emgality | <i>Galcanzumab</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | Migrena przewlekła | G43 | W ramach leczenia profilaktycznego |
| 16. | Enbrel | <i>Etanerceptum</i> | roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka | Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów | M05, M06, M08 | brak |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|----------------------------|--|
| 17. | Enbrel | <i>Etanerceptum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów | M05, M06, M08 | brak |
| 18. | Enbrel | <i>Etanerceptum</i> | roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka | Leczenie aktywnej postaci łuszczykowego zapalenia stawów | L40.5, M07.1, M07.2, M07.3 | brak |
| 19. | Enbrel | <i>Etanerceptum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | Leczenie aktywnej postaci łuszczykowego zapalenia stawów | L40.5, M07.1, M07.2, M07.3 | brak |
| 20. | Enbrel | <i>Etanerceptum</i> | roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka | Leczenie aktywnej postaci zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) | M45 | brak |
| 21. | Enbrel | <i>Etanerceptum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | Leczenie aktywnej postaci zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) | M45 | brak |
| 22. | Enbrel | <i>Etanerceptum</i> | roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka | Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK | M46.8 | brak |
| 23. | Enbrel | <i>Etanerceptum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK | M46.8 | brak |
| 24. | Erlotinib Krka | <i>Erlotinibi hydrochloridum</i> | tabletki powlekane | Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca | C34 | |
| 25. | Erlotinib Mylan | <i>Erlotinib</i> | tabletki powlekane | Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca | C34 | brak |
| 26. | Erlotinib Vipharm | <i>Erlotinib</i> | tabletki powlekane | Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca | C34 | brak |
| 27. | Esperoct | <i>Turoctocog alfa pegol</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Leczenie i profilaktyka krwawień u chorych na hemofilię A (wrodzony niedobór czynnika VIII) | D66 | w populacji pacjentów w wieku 12 lat i powyżej |
| 28. | Fotivda | <i>Tivozanib hydrochloride monohydrate</i> | kapsułki twarde | Leczenie raka nerki | C64 | brak |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|--|--|--|---|
| 29. | Humira | <i>Adalimumab</i> | roztwór do wstrzykiwań | Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim | L73.2 | brak |
| 30. | Ilaris | <i>Canakinumab</i> | roztwór do wstrzykiwań | Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych | E85, R50.9, D89.8, D89.9 | w leczeniu wrodzonych zespołów autozapalnych: CAPS (w tym: NOMID/CINCA; MWS; FCAS); TRAPS; HIDS/MKD; FMF po nieskuteczności leczenia maksymalną tolerowaną dawką kolchicyny |
| 31. | Imfinzi | <i>Durvalumab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Rak dróg żółciowych | C22.1, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9 | I linia leczenia skojarzonego z gemcytabiną i cisplatyną dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem dróg żółciowych |
| 32. | Kaftrio | <i>Ivacaftorum + tezacaftorum + elexacaftorum</i> | tabletki powlekane | Mukowiscydoza | E84 | leczenie mukowiscydozy w ramach terapii skojarzonej z zastosowaniem preparatów zawierających iwakaftor, tezakaftor oraz eleksakaftor u pacjentów w wieku co najmniej 6 lat i starszych, którzy posiadają co najmniej jedną mutację F508del w genie CFTR |
| 33. | Kalydeco | <i>Ivacaftorum</i> | tabletki powlekane | Mukowiscydoza | E84 | leczenie mukowiscydozy w ramach terapii skojarzonej z zastosowaniem preparatów zawierających iwakaftor, tezakaftor oraz eleksakaftor u pacjentów w wieku co najmniej 6 lat i starszych, którzy posiadają co najmniej jedną mutację F508del w genie CFTR |
| 34. | Kanuma | <i>Sebelipazum alfa</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy | E75.5, E75.6 | brak |
| 35. | Ketokonazol HRA | <i>Ketoconazolum</i> | tabletki | Endogenny zespół Cushinga | | > 12 rż |
| 36. | Keytruda | <i>Pembrolizumab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Leczenie raka urotelialnego | C65, C66, C67, C68 | brak |
| 37. | Keytruda | <i>Pembrolizumab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Leczenie raka nerki | C64 | I linia terapii, terapia skojarzona z aksyтынibem |

| | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---|--|--|
| 38. | Kymriah | <i>Tisagenlecleucel</i> | dyspersja do infuzji, 1,2 x10 ⁶ - 6x 10 ⁸ komórek w worku infuzyjnym | Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe | C82, C83, C85 | leczenie dorosłych chorych na chłoniaka grudkowego o stopniu złośliwości G1, G2 lub G3A, z udokumentowanym niepowodzeniem dwóch lub więcej linii leczenia systemowego, w tym zawierającego przeciwciało anti-CD20 i związku alkilujące |
| 39. | Kyprolis | <i>Carfilzomibum</i> | proszek do sporządzania roztworu do infuzji | Szpiczak plazmocytowy | C90.0 | terapia skojarzona z daratumumabem i deksametazonem dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego po uprzednim zastosowaniu 1, 2 albo 3 linii leczenia |
| 40. | Lamzede | <i>Velmanase alfa</i> | proszek do sporządzania roztworu do infuzji | Leczenie łagodnej do umiarkowanej alfa-mannozydozy | E77.1 | brak |
| 41. | Lenvima | <i>Lenvatinib</i> | kapsułki twarde | Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym | C73 | brak |
| 42. | Lojuxta | <i>Lomitapidum</i> | kapsułki twarde | Hipercholesterolemia rodzinna | E78.01 | postać homozygotyczna; populacja pacjentów dorosłych |
| 43. | Lonquex | <i>Lipegfilgrastimum</i> | roztwór do wstrzykiwań, ampulkostrzykawka | Skrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką | | u pacjentów z nowotworami złośliwymi (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni |
| 44. | Luxturna | <i>Voretigene neparovec</i> | koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Dziedziczna dystrofia siatkówki | H35.5 | u pacjentów z potwierdzoną bialleliczną mutacją genu RPE65 |
| 45. | Lynparza | <i>Olaparib</i> | tabletki powlekane | Leczenie pacjentów z przerzutowym lub niekwalifikującym się do leczenia radykalnego gruczolakiem trzustki | C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.5, C25.7, C25.8, C25.9 | u pacjentów z obecnością mutacji BRCA1/2 |
| 46. | MabThera | <i>Rituximab</i> | roztwór do wstrzykiwań | Chłoniaki złośliwe | C82, C83 | brak |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|---|---|--|---|---|
| 47. | Mekinist | <i>Trametinib</i> | tabletki powlekane | Niedrobnokomórkowy rak płuca | C34 | I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar) |
| 48. | Metopirone | <i>Metyraponum</i> | kapsułki miękkie | Leczenie pacjentów z hiperkortyzolemią | E24.0, E24.3, E24.8, E24.9 | leczenie endogennego zespołu Cushinga |
| 49. | Myalepta | <i>Metreleptinum</i> | proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Lipodystrofia | E88.1 | brak |
| 50. | Mylotarg | <i>Gemtuzumab ozogamycinum</i> | proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji | Ostra białaczka szpikowa | C92.0 | W populacji pacjentów pediatrycznych >15 r.ż. ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż) |
| 51. | Naglazyme | <i>Galsulfase</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy) | E76.2 | brak |
| 52. | Nerlynx | <i>Neratinib</i> | tabletki powlekane | Rak piersi | C50 | leczenie adjuwantowe |
| 53. | Ngenla | <i>Somatogonum</i> | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | Somatotropinowa niedoczynność przysadki | E23 | leczenie dzieci i młodzieży w wieku 3 lat i starszych z zaburzeniami wzrostu spowodowanymi niedostatecznym wydzielaniem hormonu wzrostu |
| 54. | Ocaliva | <i>Acidum obeticholicum</i> | tabletki powlekane | Pierwotne żółciowe zapalenie dróg żółciowych | K74.3 | leczenie pacjentów dorosłych, u których odpowiedź na leczenie kwasem ursodeoksycholowym (UDCA) jest niedostateczna lub w monoterapii u dorosłych z nietolerancją UDCA w ramach III linii leczenia (po UDCA i innym leczeniu brany pod uwagę w wytycznych klinicznych) |
| 55. | Onivyde pegylated liposomal | <i>Irinotecani hydrochloridum trihydricum</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Rak trzustki w stadium uogólnienia | C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9 | brak |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|--|--|---------------|---|
| 56. | Opdivo | <i>Nivolumab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Rak urotelialny | C65, C66, C67 | miejscowo zaawansowany lub przerzutowy, nieoperacyjny rak urotelialny w populacji pacjentów dorosłych, po niepowodzeniu wcześniejszej terapii opartej na pochodnych platyny |
| 57. | Ozurdex | <i>Dexamethasonum</i> | implant do ciała szklanego w aplikatorze | Zapalenie błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa | H20.0, H30.0 | brak |
| 58. | Phesgo | <i>Pertuzumab + trastuzumab</i> | roztwór do wstrzykiwań | Rak piersi | C50 | leczenie neoadjuwantowe pertuzumabem w skojarzeniu z trastuzumabem (podawanych niezależnie lub w formie produktu leczniczego złożonego, zawierającego pertuzumab i trastuzumab do podawania podskórnego) i chemioterapią |
| 59. | Phesgo | <i>Pertuzumab + trastuzumab</i> | roztwór do wstrzykiwań | Rak piersi | C50 | leczenie przerzutowego raka piersi pertuzumabem w skojarzeniu z trastuzumabem (podawanych niezależnie lub w formie produktu leczniczego złożonego, zawierającego pertuzumab i trastuzumab do podawania podskórnego) i docetakselem (I linia leczenia przerzutowego raka piersi) |
| 60. | Raxone | <i>Idebenone</i> | tabletki powlekane | Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON) | H47.2 | brak |
| 61. | Respreeza | <i>Ludzki inhibitor alfa-1-proteinazy</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji | Leczenie chorych z ciężkim niedoborem alfa-1-antytrypsyny i rozedmą płuc | J44.8, E88.0 | |
| 62. | Rinvoq | <i>Upadacitinib</i> | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | Atopowe zapalenie skóry | L20 | w ramach leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry |
| 63. | Rybrewant | <i>Amivantamab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Zaawansowany niedrobnokomórkowy rak płuca | C34 | z aktywującymi mutacjami insercyjnymi w eksonie 20 w genie kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), po niepowodzeniu terapii opartej na pochodnych platyny; w populacji pacjentów dorosłych; leczenie w monoterapii |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|---|--|-------|--|
| 64. | Saphnelo | <i>Anifrolumab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Toczeń rumieniowaty układowy | M32 | leczenie uzupełniające u dorosłych pacjentów z aktywnym, seropozytywnym toczeniem rumieniowatym układowym o postaci umiarkowanej do ciężkiej pomimo zastosowania standardowego leczenia |
| 65. | Sarclisa | <i>Isatuximab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Szpiczak plazmocytowy | C90.0 | terapia skojarzona z karfilzomibem i deksametazonem u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali wcześniej co najmniej 1-3 linie leczenia, z czynnością niewydolnością nerek w momencie rozpoczęcia terapii (eGFR <60 ml/min/1,73m ²) oraz w stanie sprawności wg ECOG 0-2) |
| 66. | Signifor | <i>Pasireotidum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | Choroba Cushinga | E24.0 | w populacji osób dorosłych, z potwierdzoną klinicznie i biochemicznie chorobą Cushinga, u których wykonanie zabiegu operacyjnego guza przysadki nie jest możliwe lub zakończyło się niepowodzeniem; tylko dla leku w dawce 10mg |
| 67. | Skilarence | <i>Dimethylis fumaras</i> | tabletki | Łuszczyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego | L40 | w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne |
| 68. | Strensiq | <i>Asfotsum alfa</i> | roztwór do wstrzykiwań | Hiperfosfatazja dziecięca | E83.3 | leczenie pacjentów z objawami kostnymi w przebiegu hipofosfatazji dziecięcej; postaci perinatalna, niemowlęca i dziecięca |
| 69. | Tafinlar | <i>Dabrafenib</i> | kapsułki | Niedrobnokomórkowy rak płuca | C34 | I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist) |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------|--|
| 70. | Tecartus | <i>Brexucabtagene autoleucl</i> | dyspersja do infuzji | Ostra białaczka limfoblastyczna | C91.0 | w populacji pacjentów w wieku 26 lat i powyżej leczonych z powodu opornej lub nawrotowej ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B, u których spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 1) pierwotna oporność na leczenie definiowana jako brak całkowitej remisji hematologicznej po leczeniu I linii 2) pierwszy nawrót choroby w przypadku remisji trwającej ≤12 miesięcy 3) drugi lub kolejny nawrót choroby 4) nawrót po przeszczepieniu allogenicznym krwiotwórczych komórek macierzystych (allo-HSCT) i po co najmniej 100 dniach przerwy pomiędzy allo-HSCT a podaniem brexucabtagenu autoleucl 5) ostra białaczka limfoblastyczna z obecnym chromosomem Filadelfia, z nietolerancją lub z niepowodzeniem leczenia co najmniej dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej BCR-ABL (TKI) albo przeciwwskazania do terapii TKI |
| 71. | Tecentriq | <i>Atezolizumab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Rak piersi | C50 | potrójnie ujemny rak piersi; terapia skojarzona z nab-paklitakselem u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub rozsiałym procesem chorobowym, z ekspresją PD-L1 ≥1%, którzy nie otrzymali terapii z powodu choroby rozsiałej |
| 72. | Tecvayli | <i>Teclistamab</i> | roztwór do wstrzykiwań | Szpiczak plazmocytowy | C90.0 | monoterapia dorosłych chorych na szpiczaka plazmocytozy, o stanie sprawności wg ECOG 0-1, u których stosowano uprzednio co najmniej trzy linie leczenia szpiczaka plazmocytozy, w tym zawierające lek immunomodulujący, inhibitor proteasomu oraz przeciwciało anti-CD38 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|--|---|-----------------|--|
| 73. | Trepulmix | <i>Treplostinil</i> | roztwór do infuzji | Przewlekłe zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne | I27, I27.0, I26 | Leczenie zakrzepowo zatorowego nadciśnienia płucnego CTEPH w monoterapii oraz w skojarzeniu z riociguatem (IV klasa czynnościowa wg NYHA/WHO; w kolejnej linii leczenia pacjentów z II/III klasą czynnościową wg NYHA/WHO po niepowodzeniu lub nietolerancji terapii riociguatem (RIOC) oraz w terapii skojarzonej treprostynil z riociguatem) |
| 74. | Tysabri | <i>Natalizumab</i> | roztwór do wstrzykiwań | Stwardnienie rozsiane | G35 | leczenie z zastosowaniem postaci leku podawanej podskórnie, w populacji pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią choroby po niepowodzeniu terapii I rzutu oraz w populacji pacjentów z szybko rozwijającą się ciężką postacią choroby u pacjentów >12 r.ż. |
| 75. | Verquvo | <i>Vericiguat</i> | tabletki powlekane | Przewlekła niewydolność serca | I50 | w populacji pacjentów dorosłych |
| 76. | Verzenio | <i>Abemaciclib</i> | tabletki powlekane | Rak piersi | C50 | w skojarzeniu z hormonoterapią w ramach leczenia uzupełniającego dorosłych pacjentów we wczesnym stadium raka piersi wykazującego ekspresję receptora hormonalnego (HR) i niewykazującego ekspresji receptora HER2 z przerzutami do węzłów chłonnych, z wysokim ryzykiem wystąpienia nawrotu |
| 77. | Voxzogo | <i>Vosoritidum</i> | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | Achondroplazja | Q77.4 | leczenie pacjentów z achondroplazją u pacjentów w wieku co najmniej 2 lat, u których nasady kości długich nie są zamknięte |
| 78. | Vyndaqel | <i>Tafamidisum</i> | kapsułki miękkie | kardiomiopatia w przebiegu amyloidozy transtyretynowej | E85 | w leczeniu dziedzicznej lub typu dzikiego amyloidozy transtyretynowej u dorosłych pacjentów z kardiomiopatią |
| 79. | Vyndaqel | <i>Tafamidisum</i> | kapsułki miękkie | rodzinna transtyretynowa polineuropatia amyloidowa (TTR-FAP) | E85.1 | |
| 80. | Xgeva | <i>Denosumab</i> | roztwór do wstrzykiwań | Guz olbrzymiokomórkowy kości | D48.0 | brak |
| 81. | Xospata | <i>Gilteritinibi fumaras</i> | tabletki powlekane | Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilteritynibem | C92.0 | leczenie podtrzymujące remisję |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------|--|---|---------------|---|
| 82. | Xtandi | <i>Enzalutamidum</i> | kapsułki miękkie | Rak gruczołu krokowego | C61 | leczenie choroby opornej na kastrację u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu oraz docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa |
| 83. | Xtandi | <i>Enzalutamidum</i> | tabletki powlekane | Rak gruczołu krokowego | C61 | leczenie choroby opornej na kastrację u chorych po wcześniejszym leczeniu octanem abirateronu oraz docetakselem, u których nie wystąpiła oporność krzyżowa |
| 84. | Yervoy | <i>Ipilimumab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Czerniak skóry lub błon śluzowych | C43 | dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii |
| 85. | Yervoy | <i>Ipilimumab</i> | koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji | Rak przełyku | C15 | I linia leczenia u pacjentów dorosłych z zaawansowanym, nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku oraz ekspresją PD-L1 na komórkach guza wynoszącą $\geq 1\%$, terapia skojarzona z niwolumabem |
| 86. | Yescarta | <i>Axicabtagene ciloleucel</i> | dyspersja do infuzji | Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe | C82, C83, C85 | leczenie dorosłych chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL), chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości z komórek B (HGBCL) lub stransformowanego w DLBCL chłoniaka grudkowego (TFL) w 2. linii leczenia, z nawrotem choroby w ciągu 12 miesięcy od zakończenia immunochemioterapii 1. linii lub choroby opornej na immunochemioterapię 1. linii niekwalifikujących się do autoHSCT |
| 87. | Zejula | <i>Niraparib</i> | kapsułki twarde | Leczenie chorych na raka jajnika, jajowodu lub raka otrzewnej | C56, C57, C48 | leczenie podtrzymujące chorych na nawrotowego platynowrażliwego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej |
| 88. | Zolgensma | <i>Onasemnogene abeparvovec</i> | roztwór do infuzji | Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12) | G12 | w zakresie pacjentów nieobjętych programem lekowym |