

UKĄSZENIA OWADÓW



Osy i szerszenie mogą być groźne.

Atakują w sytuacji zagrożenia. Jeżeli człowiek znajdzie się za blisko gniazda, może zostać wysłędzony przez strażników gniazda i zaatakowany. W wypadku rozdrażnienia kolonii najlepiej w spokoju oddalić się na bezpieczną odległość od gniazda (u szerszeni wynosi ona około 1 - 2 m), nie wykonując żadnych niepotrzebnych agresywnych ruchów, które motywują owady do dalszego ataku. Niebezpieczne mogą być użądlenia miejsc położonych blisko głównych naczyń krwionośnych i głowy. Osoby uczulone na jad powinny jak najszybciej zgłosić się do lekarza.

Szerszenie

Ukąszenie przez szerszenia może być bardzo niebezpieczne. Po użądleniu pojawiają się zaczerwienienia skóry, obrzęki, opuchlizna, gorączka, dreszcze, ból w klatce piersiowej i duszności. Owad ten potrafi ukąsić nieatakowany. Jego jad zawiera substancje atakujące krew, mięśnie, toksyny rozkładające krwinki i uszkodzające nerki. W przypadku ukąszenia przez szerszenia najlepiej zgłosić się do lekarza. Na obrzęki zastosować okłady z octu.



Pszczoly

Po użądleniu, trzeba natychmiast wyjąć żądło, zdezynfekować ranę i stosować okłady z Altacetu. Warto pić wapno.



Osy

Owady te potrafią kłuć wielokrotnie, wstrzykując jad. Miejsce ukąszenia boli i puchnie. Gdy ból mija, skóra mocno swędzi. Warto wówczas zastosować maść hydrokortyzonową lub Oxykort. Jad osy zawiera substancje uczulające, powodujące rozpad czerwonych krwinek, działa drażniąco na zakończenia nerwów. Po ukąszeniu najlepiej stosować mokre, zimne okłady. Można zanurzyć ukąszone miejsce w zimnej wodzie.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- ✓ gdy zbliża się do Ciebie pszczoła, osa lub szerszeń unikaj gwałtownych ruchów,
- ✓ W razie ataku osłoń głowę rękami lub odzieżą, a z niebezpiecznej okolicy oddalaj się powoli; najlepiej schronić się w ciemnym pomieszczeniu - pszczoły wylecą do światła,
- ✓ gdy koło Ciebie ktoś został użądłony, staraj się oddalić z tą osobą co najmniej na 50 metrów - inne owady mogą przybyć na pomoc atakującemu i użądlić ponownie,
- ✓ przebywaj z dala od kwitnących roślin i dojrzałych, opadłych na ziemię owoców,
- ✓ przed wyjściem z domu nie używaj mocno perfumowanych kremów, dezodorantów, szamponów, płynów po goleniu itp.,
- ✓ unikaj wzorzystej, jaskrawej i lejącej się odzieży - ubieraj się raczej w biel, zieleń lub beż,
- ✓ utrzymuj szczelnie zamknięte kubły z odpadkami i resztkami żywności,
- ✓ staraj się nie jeść na wolnym powietrzu słodkich owoców, marmolady, miodu czy dżemu,
- ✓ nie chodź boso po łące - pszczoły lubią koniczynę, a wiele os buduje gniazda położone na lub tuż pod powierzchnią ziemi,
- ✓ pot i dwutlenek węgla przyciągają żądłące owady, więc przy gimnastyce lub innej aktywności ruchowej na świeżym powietrzu powstaje największe niebezpieczeństwo użądlenia.

OSY ATAKUJĄ, GDY:

- ✓ gniazdo jest zagrożone lub niszczone (mogą zaatakować intruza całym rojem),
- ✓ rozdrażnią je gwałtowne ruchy ludzi lub zwierząt,
- ✓ rozdrażni je zapach, na przykład perfum lub kosmetyków,
- ✓ rozdrażnią je ciemne lub bardzo jaskrawe barwy.

PAMIĘTAJMY, ŻE OSY SĄ POZYTECZNE:

- ✓ niszczą różne owady - szkodniki roślin, którymi karmią swoje larwy,
- ✓ usuwają padlinę - znoszą do gniazda skrawki mięsa, zebrane z martwych zwierząt,
- ✓ zapylają kwiaty różnych roślin (choć nie są tak skuteczne, jak pszczoły).

JAK POMÓC UŻĄDLONEMU?

Miejsca użądlenia można:

- ✓ obłożyć na dwadzieścia minut zimnym kompresem (lodem, kawałkiem metalu) z kremem lub płynem antyhistaminowym, okładem z octu, roztworu kwasu bornego, sody oczyszczonej lub amoniaku,
- ✓ posmarować miejsce użądlenia kremem antyseptycznym,
- ✓ jeżeli wystąpią rozległe reakcje miejscowe (silny obrzęk, zaczerwienienie) - wskazane jest podanie leków przeciwzapalnych (aspiryna) lub preparatów odczulających (wapno musujące, leki antyhistaminowe),
- ✓ u alergików po użądleniu mogą wystąpić trudności z oddychaniem, kurcze mięśni, wysypka, bóle brzucha, opuchlizna - w porozumieniu z lekarzem należy podawać wapno, preparaty antyhistaminowe, glukokortykoidy i adrenalinę,
- ✓ u osoby silnie pożądlonej mogą też wystąpić omdlenia i wymioty, które mogą doprowadzić do zapaści, a nawet śmierci.

UWAGA!

OSOBOM UCZULONYM NA JAD LUB SILNIE POŻĄDLONYM NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZAPEWNIĆ POMOC LEKARSKĄ.

Jak zapobiegać osiedlaniu się os

Aby zniechęcić osy do zakładania kolonii, należy wiosną przeglądać szopy, altanki, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi osy mogą przedostać się do środka (także otwierane okna), warto zabezpieczyć siatkami o trzymilimetrowych oczkach. Bardzo ważne jest, aby nie lekceważyć pojedynczych osobników (zwłaszcza szerszeni), szukających miejsca na gniazdo - trzeba je zniszczyć, zanim założą kolonię.



informacje zaczerpnięto z Ogólnopolskiego serwisu medycznego medserwis.pl oraz portalu www.muratordom.pl