

Posiadacz zezwolenia:

SBM Développement SAS, 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Republika Francuska.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: SBM Life Science Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00 – 203 Warszawa, tel.:+48 22 635 46 44

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:(.....)

DELTAM AL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,0075 g/l (0,00075%)

**Zezwolenie MRiRW nr R-5/2014wu z dnia 02.06.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 962/2023d z dnia 13.10.2023 r.**



UWAGA

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208-Zawiera 5-chloro-2-metylo-izotiazol-3-on/2-metylo-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.

P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

OPIS DZIAŁANIA

Deltam AL to środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego stosowania o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w hobbystycznej uprawie roślin ozdobnych w pomieszczeniach zamkniętych, w gruncie i pod osłonami oraz w amatorskiej uprawie warzyw (pod osłonami i w gruncie).

Środek jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących.

STOSOWANIE ŚRODKA

Roślinę należy opryskać, aż do jej całkowitego zwilżenia pokrywając środkiem również dolną stronę liści.

ROŚLINY OZDOBNE (W GRUNCIE I POD OSŁONAMI)

róża i inne rośliny ozdobne.

mszyce, mączliki, gąsienice motyli, poskrzypka liliowa

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach.

W razie potrzeby zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

ROŚLINY WARZYWNICZE (POD OSŁONAMI)

Pomidor, ogórek, cukinia

mączlik szklarniowy

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 4

Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

ROŚLINY WARZYWNICZE (W GRUNCIE)

Pomidor

mszyce

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

Fasola, fasola szparagowa, bób.

mszyce, oprzędziki

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po upływie 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni

Brokuł, kalafior, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta głowiasta.

mszyca kapuściana, larwy bielinka kapustnika i bielinka rzepnika

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po upływie 14 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni

Brukselka

mszyca kapuściana, larwy bielinka kapustnika i bielinka rzepnika

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

Salata

mszyce, błyszczka jarzynówka

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

SPOSÓB UŻYCIA

1. WSTRZĄSNAĆ BEZPOŚREDNIO PRZED UŻYCIEM
2. Przekręcić dyszę do pozycji „ON”
3. Po użyciu przekręcić dyszę do pozycji wyjściowej „OFF”
4. Opryskiwać liście i pędy z odległości 15-30 cm, aż do ich całkowitego zwilżenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie należy stosować w odstępach krótszych niż rekomendowane w etykiecie. Nie należy przekraczać maksymalnej liczby zabiegów. W przypadku wykonywania kolejnych zabiegów lub ponownego pojawienia się szkodników stosować przemiennie preparaty z innych grup chemicznych. Unikać wykonywania zabiegów trakcie kwitnienia.

Zabieg najlepiej wykonywać wczesnym rankiem lub wieczorem. Nie opryskiwać w pełnym słońcu i na roślinach silnie przesuszonych.

Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od obszarów poddanych działaniu środka do momentu jego wyschnięcia.

W przypadku obecności w populacji mszycy lub mączlika szklarniowego form odpornych skuteczność środka może być niewystarczająca.

Zaleca się wykonanie na każdej uprawianej odmianie roślin próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia zwłaszcza przed zastosowaniem środka na większą skalę lub na szczególnie cenną kolekcję roślin.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po stosowaniu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Niebezpieczny dla pszczoł. Nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od obszarów poddanych działaniu środka do momentu jego wyschnięcia.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

rośliny ozdobne - **nie dotyczy**

pomidor, ogórek, cukinia - **3 dni**

fasola, fasolka szparagowa, bób, kapusta głowiasta, brokuł, kalafior, kapusta włoska, kapusta pekińska, brukselka, sałata – **7 dni**

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Chronić przed mrozem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -