



Minister Zdrowia

Warszawa, 21 grudnia 2021

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA

w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych obowiązującą od dnia 14 grudnia 2021 r. (załącznik poniżej).

Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed wpisaniem leku na właściwy wykaz, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o zamiarze kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/



Minister Zdrowia

Załącznik do komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wykaz produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych na dzień 10 grudnia 2021 r.

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Zawartość opakowania	Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN	Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany wraz kodem ICD-10	Uwagi
1.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)	00642621067101	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)	brak

2.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)	00642621067118	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)	brak
3.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (2ml)	00642621067125	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)	brak
4.	Adynovi	<i>Rurioctocogum alfa pegolum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	2000 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika (5ml)	00642621067132	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67)	brak
5.	Agen 5	<i>Amlodipinum</i>	tabletki	5mg	30 tabletek	05909991231811	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak

6.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	5mg	30 tabletek	05909990711567	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD- 10: C50)	brak
7.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	10mg	30 tabletek	05909990711598	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD-10: C50)	brak
8.	Agen 10	<i>Amlodipinum</i>	tabletki	10mg	30 tabletek	05909991230845	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak
9.	Aimovig	<i>Erenumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	140mg	1 wstrzykiwacz	07613421024604	Migrena przewlekła (ICD-10: G43)	brak
10.	Ajovy	<i>Fremanezumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	225mg	1 ampulkostrzykawka	0590999396497	Migrena przewlekła i epizodyczna	brak

11.	AmBisome	<i>Amphotericinum B</i>	proszek do sporządzania dyspersji do infuzji	50 mg	1 fiolka	05909990800025	Grzybica układowa (ICD-10: B37)	brak
12.	Augmentin MFF	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	400mg + 57mg	butelka 35ml	05909991343361	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak
13.	Augmentin MFF	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	400mg + 57mg	butelka 70ml	05909991343378	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak
14.	Augmentin MFF	<i>Amoxicillinum + Acidum clavulanicum</i>	proszek do sporządzania zawiesiny doustnej	400mg + 57mg	butelka 140ml	05909991343385	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak
15.	Avastin	<i>Bevacizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25mg/ml	fiolka 4ml	05909990010486	Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22)	terapia w skojarzeniu z atezolizumabem (Tecentriq)

16.	Avastin	<i>Bevacizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25mg/ml	fiolka 16ml	05909990010493	Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22)	terapia w skojarzeniu z atezolizumabem (Tecentriq)
17.	Botox	<i>Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile</i>	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	100 j.	1 fiołka	05909990674817	Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze z użyciem toksyny botulinowej	brak
18.	Brineura	<i>Cerliponase alfa</i>	roztwór do infuzji + roztwór do przepłukiwania	150 mg/ 5 ml/	2 fiołki roztworu o infuzji + 1 fiołka roztworu do przepłukiwania	05909991350994	Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2 (ICD-10: E75.4)	brak
19.	Cablivi	<i>Caplacizumabum</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	10mg	1 fiołka proszku + 1 ampułkostrzykawka rozpuszczalnika (1ml)	05909991413385	Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ICD-10 M31.1)	brak

20.	Calquence	<i>Acalabrutinib</i>	kapsułki twarde	100mg	60 kapsulek	05000456061698	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w ramach I linii leczenia w populacji pacjentów z wysokim ryzykiem genetycznym progresji
21.	Colobreathe	<i>Colistimethate sodium</i>	proszek do inhalacji, kapsułki twarde	1 662 500 j.m.	56 kapsulek twardych + 1 inhibitor proszkowy	05909991210380	Leczenie przewlekłych zakażeń i płuc wywołanych przez <i>P. aeruginosa</i> u pacjentów z mukowiscydozą	u pacjentów w wieku ≥ 6 lat
22.	Convival Chrono	<i>Natrii valproas</i>	tabletki o przedłużonym uwalnianiu	500mg	50 tabletek	05909990930142	Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe, Padaczka	brak

23.	Cosentyx	<i>Sekukunumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki	150mg/ml	2 ampułkostrzykawki po 1 ml	05909991203832	Leczenie pacjentów z aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)	brak
24.	Dysport	<i>Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile</i>	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	300 j.	1 fiolka	05909991072094	Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej (ICD-10: I61, I63, I69)	
25.	Dysport	<i>Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile</i>	proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	500 j.	1 fiolka	05909990729227	Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej (ICD-10: I61, I63, I69)	

26.	Eliquis	<i>Apixabanum</i>	tabletki powlekane	2,5mg	60 tabletek	05909990861057	Zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu ocenia się na 3 lub więcej punktów w skali CHADS2
27.	Eliquis	<i>Apixabanum</i>	tabletki powlekane	5mg	56 tabletek	05909991019396	Zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu ocenia się na 3 lub więcej punktów w skali CHADS2

28.	Eliquis	<i>Apixabanum</i>	tabletki powlekane	5mg	168 tabletek	05909991019365	Zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu ocenia się na 3 lub więcej punktów w skali CHADS2
29.	Eliquis	<i>Apixabanum</i>	tabletki powlekane	5mg	168 tabletek	05909991019440	Zapobieganie udarom mózgu i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu ocenia się na 3 lub więcej punktów w skali CHADS2

30.	Elmiron	<i>Pentosan polysulfate sodium</i>	kapsułki twarde	100mg	90 kapsułek	04260078520176	Leczenie zespołu bolesnego pęcherza moczowego z glomerulacjami lub zmianami Hunnera, śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (ICD-10: N30.1)	brak
31.	Erleada	<i>Apalutamidum</i>	tabletki powlekane	60mg	120 tabletek	05413868117059	Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego (ICD- 10: C61)	brak
32.	Erlotinib Krka	<i>Erlotinibi hydrochloridum</i>	tabletki powlekane	25mg	30 tabletek	03838989722111	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	

33.	Erlotinib Krka	<i>Erlotinibi hydrochloridum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	03838989722128	Leczenie nie drobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	
34.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05901797710835	Leczenie nie drobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak
35.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	150mg	30 tabletek	05901797710842	Leczenie nie drobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak
36.	Erlotinib Vipharm	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05901812161345	Leczenie nie drobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak

37.	Erlotinib Vipharm	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	150mg	30 tabletek	05901812161352	Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak
38.	Ezetimibe Aurovitas	<i>Ezetimibe</i>	tabletki	10mg	28 tabletek	05909991337665 9	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej	brak

39.	Forxiga	Dapaglifozinum	tabletki powlekane	10mg	14 tabletek	05909990975853	Przewlekła niewydolność serca	w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
-----	---------	----------------	--------------------	------	-------------	----------------	-------------------------------	---

40.	Forxiga	Dapaglifozinum	tabletki powlekane	10mg	30 tabletek	05909990975884	Przewlekła niewydolność serca	w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF \leq 40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
41.	Halaven	<i>Eribulinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	0,44 mg/ml	1 fiolka po 2 ml	05909991004569	Tłuszczakomięsak (ICD-10: C48)	brak

42.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	40mg/0, 8ml	2 ampułkostrzykawki + 2 gaziki	05909990005055	Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (ICD-10: L73.2)	brak
43.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań, wstrzykiwacze	40mg/0,4ml	2 wstrzykiwacze + 2 gaziki	0805408301191	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-10: K50)	brak
44.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawki	40mg/0,4ml	2 ampułkostrzykawkki + 2 gaziki nasączone alkoholem	08054083011905	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-10: K50)	brak

45.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań, pudełka	40mg/0,8ml	2 ampułkostrzykawki w pudełku	0590999000503 1	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-10: K50)	brak
46.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań ampułkostrzykawki	40mg/0,8ml	2 ampułkostrzykawki	0590999000505 5	Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (ICD-10: K50)	brak
47.	Imbruvica	<i>Ibrutinibum</i>	kapsułki twarde	140mg	90 kapsułek	0590999195137	Makroglobulinemia Waldenstroma (ICD-10: C88.0)	brak
48.	Imfinzi	<i>Durvalumabum</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	50mg/ml	fiolka po 10 ml	05000456031493	Leczenie drobnokomórkowego oraz niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak

49.	Invokana	<i>Canaglifozinum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05909991096106	Cukrzyca (ICD-10: E11)	w ramach terapii skojarzonej z innymi lekami hipoglikemizującymi z wyłączeniem insuliny
50.	Jevtana	<i>Cabazitaxel</i>	koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji	60mg/1,5 ml	fiolka	05909990850501	Rak gruczołu krwonego (ICD-10: C61)	nowotwór oporny na kastrację
51.	Kadcyla	<i>Trastuzumab emtansine</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	100mg	1 fiolka	05902768001044	Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab emtanzyna (ICD-10 C50)	w ramach leczenia adjuwantowego

52.	Kadcyla	<i>Trastuzumab emtansine</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	160mg	1 fiołka	05902768001051	Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab emtanzyna (ICD-10: C50)	w ramach leczenia adjuwantowego
53.	Kaftrio	<i>Ivacaftor + tezacaftor + elexacaftor</i>	tabletki powlekane	75mg + 50mg+ 100mg	56 tabletek	0351167143902	Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu iwakaftoru w skojarzeniu z tezakaftorem i eleksakaftorem (ICD-10: E84)	w populacji pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, którzy są homozygotyczni lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR z minimalną wartością funkcji; w skojarzeniu z lekiem Kalydeco
54.	Kalydeco	<i>Ivacaftor</i>	tabletki powlekane	150mg	28 tabletek	0351167136201	Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu iwakaftoru w skojarzeniu z tezakaftorem i eleksakaftorem (ICD-10: E84)	w populacji pacjentów w wieku co najmniej 12 lat, którzy są homozygotyczni lub heterozygotyczni pod względem mutacji F508del genu CFTR z

								minimalną wartością funkcji; w skojarzeniu z lekiem Kaftrio
55.	Kalydeco	<i>Ivacaftor</i>	tabletki powlekane	75mg	28 tabletek	0351167144503	Muukowiscydoza (ICD-10: E84)	terapia skojarzona z lekiem Symkevi
56.	Kalydeco	<i>Ivacaftor</i>	tabletki powlekane	150mg	28 tabletek	0351167136201	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	terapia skojarzona z lekiem Symkevi
57.	Kanuma	<i>Sebelipazum alfa</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	2mg/ml	1 fiolka po 10ml	05391527744375	Leczenie chorych z niedoborem lizosomalnej kwaśnej lipazy (ICD-10: E75.5, E75.6)	brak
58.	Ketokonazol HRA	<i>Ketoconazolum</i>	tabletki	200mg	60 tabletek	05909991228811	Endogenny zespół Cushinga	> 12 rż
59.	Keytruda	<i>Pembrolizumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	25mg/ml	1 fiolka 4 ml	05901549325126	Leczenie raka urotelialnego (ICD -10 C65,C66, C67, C68)	brak

60.	Kymriah	<i>Tisagenlecleucel</i>	dyspersja do infuzji,	1,2x10 ⁶ - 6x10 ⁸ komórek	worek infuzyjny	05909991384388	Leczenie tisagenlecleucelem chloniaka rozlanego z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85)	brak
61.	Lakea	<i>Losartanum kalicum</i>	tabletki powlekane	50mg	30 tabletek	05909991108212	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach;	dodatkowo we wskazaniach: nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL u pacjentów <18 r.ż.; przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL u pacjentów <18 r.ż.; leczenie renoprotekcyjne inne niż określone w ChPL u pacjentów <18 r.ż.

62.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	4mg	30 kapsułek	05036519003763	Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10: C73)	brak
63.	Lenvima	<i>Lenvatinib</i>	kapsułki twarde	10mg	30 kapsułek	05036519003770	Leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym (ICD-10: C73)	brak
64.	Levemir	<i>Insulinum detemirum</i>	roztwór do wstrzykiwań we wkładzie	100 IU/ml	5 wkładów po 3 ml	05909990005741	Cukrzyca typu 2	

65.	Lonquex	<i>Lipegfilgrastimum</i>	roztwór do wstrzykiwań, ampułkostrzykawka	6mg/0,6ml	1 ampułkostrzykawka	05909991072469	Skrócenie czasu trwania neutropenii z gorączką lub zmniejszenie częstości występowania neutopenii z gorączką	u pacjentów z nowotworami złośliwymi (za wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych poddawanych chemioterapii cytotoksycznej o odstępach czasu pomiędzy cyklami nie krótszych niż 14 dni
66.	Lutathera	<i>Lutetium (177-Lu) oxodotreotidi</i>	roztwór do infuzji	390 MBq/ml	fiolka 20,5 – 25ml	05909991350963	Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego przewodu pokarmowego wywodzącego się ze środkowego odcinka prajelita (MIDGUT)	brak

67.	Lutathera	<i>Lutetium (177-Lu) oxodotreotidi</i>	roztwór do infuzji	390 MBq/ml	fiolka 20,5 – 25ml	05909991350963	Leczenie radioizotopowe dobrze zróżnicowanego guza neuroendokrynnego trzustki (ICD-10: C25.4)	brak
68.	Mekinist	<i>Trametinibum</i>	tabletki powlekane	0,5mg	30 tabletek	05909991141813	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
69.	Mekinist	<i>Trametinibum</i>	tabletki powlekane	2mg	30 tabletek	05909991141851	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
70.	Mylotarg	<i>Gemtuzumab ozogamycinum</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	5mg	1 fiołka	05415062328576	Ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0)	W populacji pacjentów pediatrycznych > 15 r.ż ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r. ż.

71.	Naglazyme	<i>Galsulfase</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg	1 fiołka po 5 ml	05909990614745	Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (zespół Maroteaux-Lamy) (ICD-10: E76.2)	brak
72.	Neoparin Forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	12 000 j.m.	10 ampułko-strzykawk po 0,8 ml	05906395161126	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak
73.	Neoparin Forte	<i>Enoxaparinum natriicum</i>	roztwór do wstrzykiwań	15 000 j.m.	10 ampułko-strzykawk po 1 ml	05906395161164	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak
74.	Novo-Helisen Depot	<i>Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego</i>	zawiesina do wstrzykiwań	50 TU/ml; 500 TU/ml; 5000TU/ml	3 fiołki 4,5 ml	05909990001118	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak
75.	Nerlynx	<i>Neratinibum</i>	tabletki powlekane	40mg	180 tabletek	05909991414009	Rak piersi (ICD-10: C50)	leczenie adjuwantowe

76.	Olumiant	<i>Baricitinibum</i>	tabletki powlekane	2mg	35 tabletek	03837000170740	Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10: M05, M06, M08)	brak
77.	Onivyde	<i>Irinotecani hydrochloridum trihydricum</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka 10ml	05909991308438	Rak trzustki w stadium uogólnienia (ICD-10: C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.7, C25.8, C25.9)	brak
78.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Rak urotelialny (ICD-10: C65, C66, C67)	brak

79.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Rak urotelialny (ICD-10: C65, C66, C67)	brak
80.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Rak nerki (ICD-10: C64)	w ramach III linii leczenia systemowego
81.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Rak nerki (ICD-10: C64)	w ramach III linii leczenia systemowego
82.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią
83.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	w skojarzeniu z ipilimumabem (Yervoy) oraz chemioterapią

84.	Perjeta	<i>Pertuzumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	30mg/ml	1 fiolka 14 ml	05902768001006	Pooperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem (ICD-10 C50)	brak
85.	Piqray	<i>Alpelisibum</i>	tabletki powlekane	150mg	56 tabletek	07613421024826	Leczenie chorych na raka piersi (ID-10: C50)	terapia skojarzona z fulwestrantem, u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy

86.	Piqray	<i>Alpelisibum</i>	tabletki powlekane	200mg	28 tabletek	07613421024840	Leczenie chorych na raka piersi (ID-10: C50)	terapia skojarzona z fulwestranem, u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy
87.	Piqray	<i>Alpelisibum</i>	tabletki powlekane	50mg + 200mg	56 tabletek	07613421024833	Leczenie chorych na raka piersi (ID-10: C50)	terapia skojarzona z fulwestranem, u pacjentów po progresji lub nawrocie w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy

88.	Posaconazole Zentiva	<i>Posaconazolium</i>	tabletki dojelitowe	100mg	24 tabletki	05909991420895	zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych	brak
89.	Pradaxa	<i>Dabigatranum etexilatium</i>	kapsułki twarde	110mg	60 kapsułek	05909990887460	prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków	brak

90.	Pradaxa	<i>Dabigatranum etexilatum</i>	kapsułki twarde	150mg	60 kapsułek	05909990641277	prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków	brak
91.	Ravicti	<i>Glyceroli phenylbutyras</i>	płyn doustny	1,1 g/ml	butelka 25ml	07350110580217	Zaburzenia cyklu mocznikowego	brak
92.	Raxone	<i>Idebenone</i>	tabletki powlekane	150mg	180 tabletek	07640137910150	Leczenie dziedzicznej neuropatii wzrokowej Lebera (LHON) (ICD-10: H47.2)	brak

93.	Reblozyl	<i>Luspaterceptum</i>	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	75mg	1 fiołka	07640133688251	Leczenie dorosłych pacjentów z niedokrwistością zależną od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia (ICD-10 D46.1)	brak
-----	----------	-----------------------	--	------	----------	----------------	---	------

94.	Reblozyl	<i>Luspaterceptum</i>	proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	25mg	1 fiolka	07640133688244	Leczenie dorosłych pacjentów z niedokrwistością zależną od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych o ryzyku bardzo niskim, niskim i pośrednim z obecnością pierścieniowatych syderoblastów, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie erytropoetyną, lub którzy nie kwalifikują się do takiego leczenia (ICD-10 D46.1)	brak
-----	----------	-----------------------	---	------	----------	----------------	---	------

95.	Remodulin	<i>Treprostynilum</i>	roztwór do infuzji	1mg/ml	1 fiolka po 20ml	05909990046805	Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)	brak
96.	Remodulin	<i>Treprostynilum</i>	roztwór do infuzji	2,5mg/ml	1 fiolka po 20ml	05909990046850	Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)	brak
97.	Remodulin	<i>Treprostynilum</i>	roztwór do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 20ml	05909990046867	Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)	brak
98.	Reseligo	<i>Goserelinum</i>	implant w ampułko-strzykawce	3,6mg	1 ampułko-strzykawka	05909991256197	Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników	do 3 cykli leczenia
99.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	5mg	21 kapsułek	05909990086696	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia

100.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	10mg	21 kapsułek	05909990086702	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
101.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	15mg	21 kapsułek	05909990086764	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
102.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	20mg	7 kapsułek	07640133687704	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
103.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	21 kapsułek	05909990086771	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
104.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	7 kapsułek	: 07640133687322	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia

105.	Rozlytrek	<i>Entrectinibum</i>	kapsułki twarde	100mg	30 kapsulek	07613326024891	Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	z potwierdzoną obecnością rearanżacji w genie ROS1
106.	Rozlytrek	<i>Entrectinibum</i>	kapsułki twarde	200mg	90 kapsulek	07613326024624	Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	
107.	Rulid	<i>Roxithomycinum</i>	tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej	50mg	10 tabletek	05909990785919	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak
108.	Rulid	<i>Roxithomycinum</i>	tabletki powlekane	150mg	10 tabletek	05909990085910	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak

109.	Rybelsus	<i>Semaglutide</i>	tabletki	3mg	30 tabletek	05712249113537	Cukrzyca typu 2	u pacjentów stosujących co najmniej dwa doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę bazową w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z HbA1c \geq 8%, z otyłością
110.	Rybelsus	<i>Semaglutide</i>	tabletki	7mg	30 tabletek	05712249113544	Cukrzyca typu 2	definiowaną jako BMI \geq 30 kg/m ² oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym zdefiniowanym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory, lub retinopatię, lub obecność 2

111.	Rybelsus	<i>Semaglutide</i>	tabletki	14mg	30 tabletek	05712249113551	Cukrzyca typu 2	lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu
112.	Sarclisa	<i>Izatumimab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	fiolka 5 ml	05909991727818	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	w przypadku choroby odpornej i nawrotowej; terapia skojarzona z pomalidomidem i deksametazonem
113.	Sarclisa	<i>Izatumimab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	fiolka 25ml	05909991427832	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	
114.	Simcovas	<i>Simvastatinum</i>	tabletki powlekane	20mg	05909991048488	30 tabletek	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak

115.	Simcovas	<i>Simvastatinum</i>	tabletki powlekane	40mg	05909991048495	30 tabletek	we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach	brak	
116.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg		90 tabletek	08430308130574	Łuszczycyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
117.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg		180 tabletek	08430308130567	Łuszczycyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne

118.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	30mg	42 tabletki	08430308130581	Łuszczycyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	w populacji pacjentów, u których nie rozważa się innego leczenia systemowego niż leczenie biologiczne
119.	Soliris	<i>Eculizumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300mg	1 fiolka 30ml	05909990643776	Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (ICD-10: D59.5)	brak
120.	Stelara	<i>Ustekinumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	130mg	1 fiolka po 30 ml	05909991307066	Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)	brak
121.	Stelara	<i>Ustekinumab</i>	roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce	90mg	1 ampułkostrzykawka po 1 ml	05909997077512	Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10: K51)	brak

122.	Symkevi	<i>tezacaftor + ivacaftor</i>	tabletki powlekane	50mg + 75mg	28 tabletek	00351167144404	Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu tezakaftoru i iwakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10: E84)	w skojarzeniu z lekiem Kalydeco
123.	Symkevi	<i>tezacaftor + ivacaftor</i>	tabletki powlekane	100mg + 150mg	28 tabletek	0351167136102	Leczenie mukowiscydozy przy zastosowaniu tezakaftoru i iwakaftoru w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10: E84)	w skojarzeniu z lekiem Kalydeco
124.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	120 kapsulek	05909991078591	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
125.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	28 kapsulek	05909991078584,	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)

126.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	120 kapsulek	05909991078645	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
127.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	28 kapsulek	05909991078607	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, terapia skojarzona z trametynibem (Mekinist)
128.	Tecentriq	<i>Atezolizumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	1200mg	1 fiolka po 20ml	05902768001167	Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10: C22.0)	terapia skojarzona z bewacyzumabem (Avastin)
129.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej	125mg	30 saszetek	05391528830497	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (ICD-10: G71.0)	z mutacją nonsense w genie dystrofiny
130.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej	250mg	30 saszetek	05391528830503	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (ICD-10: G71.0)	z mutacją nonsense w genie dystrofiny

131.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300mg	1 fiolka	05391527743552	Nocna napadowa hemoglobinuria (ICD-10: D59.5)	brak
132.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	300mg	1 fiolka	05391527743552	Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) (ICD-10 D59.3)	brak
133.	Valdoxan	<i>Agomelatinum</i>	tabletki powlekane	25mg	28 tabletek	05909990686568	Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii	brak

134.	Vipidia	<i>Alogliptinum</i>	tabletki powlekane	12,5mg	28 tabletek	05903263900764	Cukrzyca typu 2	terapia w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi stężenie glukozy, jeżeli produkty te w monoterapii wraz z dietą i wysiłkiem fizycznym nie zapewniają dostatecznej kontroli glikemii, a stosowanie ich w skojarzeniu jest przeciwwskazane
------	---------	---------------------	--------------------	--------	-------------	----------------	-----------------	---

135.	Vipidia	<i>Alogliptinum</i>	tabletki powlekane	25mg	28 tabletek	5903263900771	Cukrzyca typu 2	skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi stężenie glukozy, jeżeli produkty te w monoterapii wraz z dietą i wysiłkiem fizycznym nie zapewniają dostatecznej kontroli glikemii, a stosowanie ich w skojarzeniu jest przeciwwskazane
136.	Xgeva	<i>Denosumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	120mg	1 fiolka po 1,7ml	05909990881789	Guz olbrzymiokomórkowy kości (ICD-10: D48.0)	brak
137.	Xospata	<i>Gilteritinibi fumaras</i>	tabletki powlekane	40mg	84 tabletki	05909991426460	Leczenie nawrotowej ostrej białaczki szpikowej gilterytynibem (ICD-10: C92.0)	brak

138.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 40ml	05909990872459	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
139.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/l	1 fiolka po 10ml	05909990872442	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	terapia skojarzona z niwolumabem (Opdivo)
140.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/ml	1 fiolka po 40ml	05909990872459	Czerniak skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii
141.	Yervoy	<i>Ipilimumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	5mg/l	1 fiolka po 10ml	05909990872442	Czerniak skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)	dotyczy II linii leczenia choroby w III lub IV stopniu zaawansowania; leczenie w monoterapii

142.	Yescarta	<i>Axicabtagene ciloleuceł</i>	dyspersja do infuzji	0,4 - 2x10 ⁸ komórek	1 worek	05909991438487	Chłoniaki z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85)	brak
143.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	100mg	56 kapsulek	05909991425487	Leczenie podtrzymujące niraparybem chorych na zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)	brak
144.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	100mg	84 kapsułki	05909991425494	Leczenie podtrzymujące niraparybem chorych na zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)	brak

145.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	100mg	56 kapsułek	05909991425487	Rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)	po co najmniej dwóch liniach leczenia schematami zawierającymi pochodne platyny, z obiektywną odpowiedzią na leczenie po ostatnim schemacie leczenia; niezależnie od statusu mutacji BRCA1/2
------	--------	------------------	-----------------	-------	-------------	----------------	---	--

146.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	100 mg	84 kapsułki	: 05909991425494	Rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)	po co najmniej dwóch liniach leczenia schematami zawierającymi pochodne platyny, z obiektywną odpowiedzią na leczenie po ostatnim schemacie leczenia; niezależnie od statusu mutacji BRCA1/2
147.	Zeposia	<i>Ozanimod</i>	kapsułki twarde	0,23mg + 0,46mg	7 kapsułek	07640133688220	Leczenie stwardnienia rozсіяnego (ICD-10: G35)	brak
148.	Zeposia	<i>Ozanimod</i>	kapsułki twarde	0,92mg	28 kapsułek	07640133688237	Leczenie stwardnienia rozсіяnego (ICD-10: G35)	brak

149.	Zoladex	<i>Goserelinum</i>	implant podskórny	3,6 mg	1 ampułko- strzykawka	05909990082315	Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników	do 3 cykli leczenia
150.	Zolgensma	<i>Onasemnogene abeparvovecum</i>	roztwór do infuzji	2×10^{13} vg/ml	7 fiolek po 8,3ml	05397227702851	Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) (ICD-10: G12)	postać 5q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu I lub u chorych z postacią 5q z bialleliczną mutacją SMN1 i nie więcej niż 3 kopiami genu SMN2