

WZÓR

Oddział Laboratoryjny
PSSE w Bielsku - Białej

Załącznik nr 16 z dnia 19.01.2018r.
do Procedury CHZZ/PO-03

INSTRUKCJA POBIERANIA I TRANSPORTOWANIA PRÓBEK KAŁU DO BADAŃ PARAZYTOLOGICZNYCH

- 1/ Kał pobiera się trzykrotnie w odstępach 3-5 dni. Pierwsza próbka powinna być pobrana zanim rozpocznie się leczenie przeciw pasożytnicze.
- 2/ Próbkę kału przenieść do naczynia transportowego za pomocą łąpatki osadzonej na zakrętce (w ilości 1/2 pojemnika), szczelnie zamknąć i opisać.
- 3/ Opisaną i zabezpieczoną przed samo otwarciem próbkę wraz z czytelnie wypełnionym zleceniem (zabezpieczyć przed skażeniem), należy dostarczyć niezwłocznie do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Jeśli nie ma takiej możliwości próbkę należy przechować w chłodni do 24h.
Przy podejrzeniu obecności pierwotniaków w kale, próbkę należy dostarczyć natychmiast po wypróżnieniu w temp. 37°C (może być w termosie).
- 4/ Wymaz na owsiki należy pobrać odlepiając jeden koniec przezroczystej taśmy ze szkiełka podstawowego i przytykając do fałdów odbytu (zaraz po przebudzeniu) i ponownie przylepić taśmę na szkiełko. Zawinąć szkiełko w podpisaną kartkę papieru.

