


# Коклюш

## ГОСТРЕ ІНФЕКЦІЙНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ



***Bordetella pertussis*** –  
трансмисивне бактеріальне  
інфекційне захворювання,  
спричинене бактеріями  
коклюшу.

## «Надзвичайно висока контагіозність»

**близько 80%**  
людей без імунітету  
заражаються після контакту  
з хворою людиною.



У 2020 році близько 20% людей  
з коклюшем потребували  
**госпіталізації.**



**ЩОРІЧНО  
- ВИПАДКІВ  
У ВСЬОМУ  
СВІТІ**



**ЩОРІЧНО  
- КІЛЬКІСТЬ  
СМЕРТЕЙ  
У СВІТІ**



**ЩОРІЧНО НЕВРО-  
ЛОГІЧНИХ  
УСКЛАДНЕНЬ  
У СВІТІ**



Характерним симптомом  
коклюшу є виснажливий  
сухий кашель, який  
триває кілька місяців,  
**нападоподібний кашель,**  
інші симптоми – фарингіт,  
лихоманка,  
нежить.

**У Польщі на коклюш  
хворіє щорічно від 5000  
до 7000 людей.**

Як запобігти?

# БУСТЕРНА ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ КОКЛЮШУ

Персистенція антитіл з роками зменшується. Ось чому **повторні щеплення** необхідні!

Щеплення проти кашлюку **безкоштовно для дітей.**



**У програмі захисних щеплень передбачається, що дітям віком від 6 років в обов'язковому порядку вводяться нагадувальні дози вакцини проти коклюшу і підліткам у віці 14 років.**

**Бустерна доза** вакцини проти дифтерії, правця та коклюшу (протидифтерійна та коклюшова вакцина), що вводиться один раз на 10 років, рекомендована для:

- Молоді **14 або 19 років**,
- Медичного персоналу Неонатального та педіатричного відділень,
- Осіб, які контактують з немовлятами,
- Вагітних жінок.

Навіщо

## робити щеплення

### Ускладнення:

- гіпоксія,
- ціаноз,
- апное,
- непритомність,
- блювота,
- кровотеча з очей, носа і вух,
- розрив кровоносних судин очного яблука та обличчя,
- набряк обличчя.

### Смертельні ускладнення:

- пошкодження головного мозку,
- пневмонія.