

Czy wiesz... jakie zagrożenie niesie wirus ptasiej grypy dla Twojej fermy drobiu?

PTASIA GRYPA?

Grypa ptaków- pomór drobiu, choroba wirusowa,
która dotyka w głównej mierze ptaki (zarówno drób jak i ptaki dzikie).

Wyróżnia się wiele odmian wirusa grypy, które oznaczane są
symbolami, takimi jak np. H5N1, H5N5, H5N6 czy H5N8.





Zakażeniu wirusami ptasiej grypy mogą ulec także ssaki,
w tym człowiek, choć jak dotąd są to sytuacje bardzo rzadkie,
niemniej przebieg choroby może być bardzo ciężki.

Dotychczas nie opracowano skutecznych leków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) regularne szczepienie się
przeciwko grypie sezonowej może zmniejszyć ryzyko zachorowania
i uchronić przed ciężkim przebiegiem zakażenia.

Jak dotąd, jedyną efektywną bronią w walce z grypą ptaków jest:

- szybkie rozpoznanie choroby w laboratorium;
- skuteczna likwidacja ptaków w ognisku;
- wprowadzenie tymczasowych restrykcji na obszarze występowania grypy,
aby zapobiec jej dalszemu rozprzestrzenieniu
(zgodnie z decyzją powiatowego lekarza weterynarii).



Osoby (pracownicy oraz inne osoby świadczące pracę), które mają stały
kontakt z zakażonym ptactwem są najbardziej narażone na styczność
z wirusem. W ich przypadku należy dokonać oceny ryzyka narażenia
w kontekście możliwości zakażenia wirusami grypy ptaków.



*Handel drobiem jest dozwolony tylko w okresie, gdy grypa na danym obszarze nie występuje,
dodatkowo w ściśle wyznaczonych miejscach i pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.*

WIEDZA = ZAPOBIEGANIE

W jaki sposób dochodzi do rozprzestrzeniania wirusów grypy ptaków i jak wirus przedostaje się do gospodarstwa?


Drogi zakażenia

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową.

Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi (ptactwem wodnym, ich odchodami), czy korzystanie ze wspólnych zbiorników wodnych.

Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez:

- zanieczyszczoną paszę,
- wodę,
- nawóz,
- ściółkę,
- sprzęt,
- środki transportu.



ŹRÓDŁO: PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek NAJCZĘŚCIEJ:



- hodowca oraz jego rodzina



- pracownicy:
 - ferm,
 - zakładów utylizacji



- lekarze weterynarii opiekujący się stadem



- osoby biorące udział w zwalczaniu choroby

przenoszą wirus w sposób pośredni, tzn. na obuwiu, odzieży, sprzęcie czy na środkach lokomocji (koła pojazdów).

ZAPAMIĘTAJ:

Ograniczyć ryzyko można poprzez odzież ochronną, maski, gogle oraz rękawice.

Podejrzewasz wirus grypy wśród drobiu? ➡ ZGŁOŚ (!)

**➡ Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
lub najbliższemu lekarzowi weterynarii**



Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii posiadacz drobiu zobowiązany jest do:

- 1. Izolacji i strzeżenia** w gospodarstwie wszystkich przebywających w nim ptaków.
- 2. Wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania** produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych.
- 3. Nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego** (nasienia, komórek jajowych, zarodków).
- 4. Uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń** lub miejsc, w których znajdują się ptaki podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Likwidacja ogniska grypy ptaków

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.



W przypadku wystąpienia ogniska zakażeń ptasią grypą wśród ptactwa przestrzegaj:

- dbałości o higienę rąk oraz higienę kichania/kaszlu;
- wytycznych dot. 5. kroków higieny podczas przygotowywania posiłków z produktów pochodzenia zwierzęcego, tj.:
 1. Utrzymuj czystość;
 2. Oddzielaj żywność surową od ugotowanej;
 3. Gotuj dokładnie;
 4. Utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze;
 5. Używaj bezpiecznej wody i żywności.
- konieczności zgłoszenia obecności padłych ptaków/innych zwierząt do właściwych lokalnych (powiatowych/gminnych/miejskich) służb porządkowych;
- zaleceń organów Inspekcji Weterynaryjnej, czy służb ochrony środowiska na terenach występowania ognisk zakażeń wśród ptaków.

JEŻELI MIAŁEŚ KONTAKT Z WIRUSEM PTASIEJ GRYPY ORAZ ZAOBSERWOWAŁEŚ U SIEBIE PONIŻSZE OBJAWY CHOROBOWE:



gorączka lub stan podgorączkowy, złe samopoczucie, ból głowy, ból mięśni i stawów, objawy ze strony układu: pokarmowego, oddechowego (nieżyt śluzowy nosa, kaszel, ból gardła, duszność) oraz zapalenia spojówek, objawy neurologiczne



**NIEZWŁOCZNIE ZADZWOŃ NA NUMER ALARMOWY
PODANY NA STRONIE INTERNETOWEJ
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNEJ**



SKORZYSTAJ TAKŻE Z TELEPORADY LEKARSKIEJ (WZGLĘDY KLINICZNE)



**ZASTOSUJ 10. DNIOWĄ SAMOBSERWACJĘ
OD OSTATNIEGO DNIA NARAŻENIA NA KONTAKT Z WIRUSEM**

Osoba objawowa powinna **nosić maseczkę** oraz **przestrzegać zasad higieny rąk i oddychania** (np. kasłać czy kichać w jednorazową chusteczkę, czy zgięcie łokciowe)

WAŻNE:

Nigdy nie dotykaj martwych lub chorych ptaków (zarówno żyjących dziko, jak i hodowlanych) bez wcześniejszego zabezpieczenia się środkami ochrony osobistej.

OPRACOWANO NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW:



PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO
strona internetowa: www.piwet.pulawy.pl/komunikaty
zakładka: Wysoce zjadliwa grypa ptaków



GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
strona internetowa: www.gov.pl/web/gis/glowny-inspektorat-sanitarny