



























# Program Szczepień Ochronnych **obowiązujący od 01.01.2024**

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU										
Rocznik urodzenia		Gruźlica	Rotawirusy <sup>1</sup>	WZW typu B*	Błonica, tężec, krztusiec	Błonica, tężec	HIB**	IPV***	Pneumokoki	Odra, świnka, różyczka
2024	1 doba (przed wypisem ze szpitala)									
	2 miesiąc życia (po ukończeniu 6 tyg.)									
	4 miesiąc życia				 po 6-8 tyg. od poprzedniego szczepienia <sup>2</sup>		 po 8 tyg. od poprzedniego szczepienia		 po 8 tyg. od poprzedniego szczepienia	
	5-6 miesiąc życia							 po 8 tyg. od poprzedniego szczepienia		
	6 miesiąc życia				 po 6-8 tyg. od poprzedniego szczepienia <sup>2</sup>		 po 8 tyg. od poprzedniego szczepienia			
	7 miesiąc życia									
2023	13 -15 miesiąc życia								 po upływie min. 6 m-cy od II dawki	
	16-18 miesiąc życia									
2019 (po ukończeniu 5 r.ż., do ukończenia 6 r.ż.)					 DTaP					
2011 (po ukończeniu 13 r.ż., do ukończenia 14 r.ż.)					 Tdap					
2006 (po ukończeniu 18 r.ż., do ukończenia 19 r.ż.)										

<sup>1</sup> Zaleca się zakończenie pełnego schematu szczepień przed ukończeniem 22 tyg. życia. Należy zachować odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami nie krótsze, niż 4 tygodnie.

<sup>2</sup> Zgodnie z częścią III PSO na 2024 r.

\* WZW typu B oznacza wirusowe zapalenie wątroby typu B

\*\* Hib oznacza inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b

\*\*\* IPV oznacza poliomyelitis tj. ostre nagminne porażenie dziecięce