



INFORMACJA DLA POWODZIAN

Wytyczne na temat swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób

Podczas prac związanych z usuwaniem skutków powodzi może dojść do sytuacji zagrożenia tężcem!

TEŻEC jest chorobą zakaźną, która występuje na całym świecie. Objawy tężca wynikają z działania neurotoksyny produkowanej przez bakterie *Clostridium tetani*.

Przykładowe objawy:

zwiększone napięcie mięśniowe, bolesne i długotrwałe skurcze różnych grup mięśniowych, sztywność otwierania ust – może być poprzedzony mrowieniem mięśni twarzy, bólem głowy, ogólnym niepokojem.

Okres wylegania:

zazwyczaj od 2 do 21 dni, przeciętnie 10 dni.

TEŻEC JEST CHOROBA NIEBEZPIECZNĄ. NIE NALEŻY LEKCEWAŻYĆ ŻADNEGO ZRANIENIA, ZADRAPANIA ZWŁASZCZA ZABRUDZONEGO BRUDNĄ/SKAŻONĄ WODĄ, GLEBĄ

Gdy dojdzie do zranienia/zadrapania należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem!

Lekarz zdecyduje o dalszym postępowaniu biorąc pod uwagę:

- historię uprzednich szczepień,
- naturę rany,
- stan pacjenta.

I. SZCZEPIENIA PRZECIW TEŻCOWI U OSÓB ZRANIIONYCH

Wytyczne dotyczące swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób

Historia szczepień pacjenta	Ryzyko wystąpienia tężca	
	niskie	wysokie
Nieszczepieni lub niekompletnie szczepieni lub historia szczepień niepewna	szczepionka Td lub T, następnie kontynuować kolejne dawki szczepienia podstawowego według schematu 0; 1; 6 miesiąc	szczepionka Td lub T + antytoksyna (LIT – swoista immunoglobulina 250/500 j.m.) następnie kontynuować kolejne dawki szczepienia podstawowego według schematu 0; 1; 6 miesiąc
szczepienie podstawowe lub przypominające – ostatnia dawka więcej niż 10 lat temu	szczepionka Td lub T – jedna przypominająca dawka	szczepionka Td lub T – jedna przypominająca dawka + antytoksyna (LIT – swoista immunoglobulina 250/500 j.m.)
szczepienie podstawowe lub przypominające – ostatnia dawka 5–10 lat temu	szczepionka Td lub T – jedna przypominająca dawka	szczepionka Td lub T – jedna przypominająca dawka
szczepienie podstawowe lub przypominające – ostatnia dawka mniej niż 5 lat temu	nie wymaga	nie wymaga ewentualnie gdy szczególnie wysokie ryzyko należy rozważyć szczepionką Td lub T – jedna przypominająca dawka