

INSTRUKCJA POBRANIA I TRANSPORTU PRÓBEK KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK Z RODZAJU SALMONELLA/SHIGELLA

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych obejmuje trzy próbki kału zebrane z trzech kolejnych dni na wymazówki z podłożem transportowym.

UWAGA: Kału nie należy pobierać w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed upływem min. 7 dni od jej zakończenia.

1. Kupić trzy wymazówki z podłożem transportowym
2. Próbkę pobrać według następującego schematu:

Próbki kału do badania na nosicielstwo pałeczek Salmonella-Shigella należy pobierać w trzech kolejno po sobie następujących dniach.



Próbki pobrać według następującego schematu:

DZIEŃ 1 – wymazówka nr 1	DZIEŃ 2 – wymazówka nr 2	DZIEŃ 3 – wymazówka nr 3
<ul style="list-style-type: none">• kał oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku• za pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał był wyraźnie widoczny na waciku.		
<ul style="list-style-type: none">• jeżeli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta.• wymazówkę włożyć do probówki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania.• pobrane próbki przechowywać w temperaturze lodówki (2 – 8°C). NIE ZAMRAŻAĆ!• wymazówki do badań umieścić w pojedynczym przezroczystym foliowym woreczku i dostarczyć do laboratorium wszystkie razem trzeciego dnia (najpóźniej czwartego).		