

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 511/2024d z dnia 09.05.2024 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 4/2015wu z dnia 10.03.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

YOU Solutions Germany GmbH, Freundallee 9a, D-30173 Hannover, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 (0) 221 991990, e-mail: emeabiocidesregistrations@arxada.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BEST-PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka Jawna, ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno,
tel./fax: +48 32 617 75 71, fax: +48 32 615 00 07, e-mail: handel@bestpest.com.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "BEST-PEST" Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka Jawna, ul. Moździerzowców 6b, 43-602 Jaworzno,
tel./fax: +48 32 617 75 71, fax: +48 32 615 00 07, e-mail: handel@bestpest.com.pl

Ślimax Agro Plus GB

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

Metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu) – **30 g/kg (3 %)**

Zezwolenie MRiRW nr R- 4/2015wu z dnia 10.03.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 511/2024d z dnia 09.05.2024 r.



Uwaga

H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405

Przechowywać pod zamknięciem.

Środek toksyczny dla zwierząt domowych.

Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z preparatem.

Preparat bardzo niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych. W przypadku podejrzenia spożycia przez zwierzęta: skontaktować się natychmiast z lekarzem weterynarii.

Nie wyklądać w kupkach.

OPIS DZIAŁANIA

Ślimax Agro Plus GB jest środkiem ślimakobójczym o działaniu żołądkowym i kontaktowym w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimaków nagich w uprawach rolniczych. Środek wabi ślimaki i jest chętnie przez nie zjadany.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rozsypać równomiernie na polu na przykład aplikatorem do granulowanych środków ochrony roślin.

pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do końca fazy krzewienia (BBCH 10 - 29)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**

Odstęp między zabiegami: **co najmniej 14 dni**

burak cukrowy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do fazy 9 liści. (BBCH 10 - 19)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**

Odstęp między zabiegami: **co najmniej 14 dni**

rzepak ozimy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do końca fazy rozwoju pędów bocznych (BBCH 10 - 29)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**

Odstęp między zabiegami: **co najmniej 14 dni**

ziemniak

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7 kg/ha

Termin stosowania:

Stosować po zaobserwowaniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki po wschodach do fazy zawiązywania bulw, gdy bulwy osiągną 50% typowej masy (BBCH 10 - 45)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: **3**

Odstęp między zabiegami: **co najmniej 14 dni**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych lub wieczornych.
2. Środek nie pleśnieje zalegając na powierzchni ziemi.
3. Środek jest odporny na deszcz.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu oraz odzież ochronną.

Nie wdychać pyłu.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony ptaków/dziko żyjących ssaków przypadkowo rozsypany środek musi zostać usunięty.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze nie przekraczającej 35°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -