

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 118/2024d z dnia 13.02.2024 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 26/2014 z dnia 26.02.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

Certis Belchim B.V., Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, Królestwo Niderlandów, tel: +31 (0)30 200 1200

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Certis Belchim B.V. Sp. z o.o., Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 214, 02 – 486 Warszawa, Tel.: + 48 660 485 548

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. 22 731 50 87


Diabolo 100 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

imazalil (związek z grupy imidazoli) - 100 g/l (9,34%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 26/2014 z dnia 26.02.2014 r.
ostatnio zmieniono decyzją MRiRW nr R - 118/2024d z dnia 13.02.2024 r.

	
NIEBEZPIECZEŃSTWO	
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351	Podejrzewa się, że powoduje raka.
H 410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312	W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P304 + P340	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P391	Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka (sadzeniaków) przed chorobami przechowalniczymi.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

parch srebrzysty, sucha zgnilizna, fomoza ziemniaka (gangrena)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml środka/100 kg bulw.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 100-200 ml/100 kg ziemniaków (w zależności od urządzeń aplikujących).

Zabieg wykonać jednorazowo, zapobiegawczo lub interwencyjnie po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, tuż po zbiorach ziemniaków maksymalnie (w ciągu) 5-10 dni po zbiorze (ziemniaków z pola), przed umieszczeniem ich w przechowalni.

Środek można również zastosować interwencyjnie w celu ograniczenia rozwoju chorób, po zaobserwowaniu objawów infekcji.

Uwaga!

1. Bulwy ziemniaków na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał sadzeniakowy.
2. Środek stosować sprzętem specjalistycznym, przez ekipy przeszkolone.
3. W ochronie bulw ziemniaka przed chorobami w przechowalniach stosować rotację środków z różnych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Ściśle przestrzegać zalecanej dawki środka.

Zaprawianie przeprowadzać na podajniku taśmowym lub rolkowym przy użyciu urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Sprzęt do zaprawiania ziemniaków zabezpieczyć/przykryć tak aby nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej.

Aplikację środka należy prowadzić za pomocą urządzeń wykorzystujących technikę ULV np. wirujących dysków, wirujących bębnow siatkowych itp. Podczas zaprawiania bulw ziemniaków środek należy stosować nad stołem selekcyjnym lub taśmociągami w celu zapewnienia równomierności naniesienia i precyzyjnej dawki na powierzchnię wszystkich bulw. Kontrolę dozowania środka można prowadzić także za pomocą automatycznych systemów aplikacji preparatu i objętości podawanych bulw.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Bulwy ziemniaków na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał sadzeniakowy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Bulwy ziemniaków na które zastosowano środek mogą być wykorzystane wyłącznie jako materiał sadzeniakowy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy/zawiesiny użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki należy:

- jeżeli jest to możliwe, zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub

- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną oraz okulary i maskę do ochrony oczu i twarzy zabezpieczające przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0 °C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -