



Znak sprawy: DHR.HOR.rs.8208.2.1.2020

### **POSTANOWIENIE nr 25/2024**

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, postanawiam z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w zezwoleniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R - 12/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Stabilan 400 SL produkcji spółki Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, w następujący sposób:

Poniżej wskazane załączniki do zezwolenia:

- załącznik nr 2 - Opis działania oraz warunki stosowania środka ochrony roślin
  - załącznik nr 9 - Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin
- otrzymują brzmienie określone w niniejszym postanowieniu.

## ROŚLIN

REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL) do stosowania jako środek zapobiegający wyleganiu zbóż.

Środek hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż, w rezultacie zapobiegając ich wyleganiu. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia mechaniczny zbiór. Zapobiega powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna i jego porostania.

Środek stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w warunkach glebowo - klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania.

## STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

### Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny jęczyzek ostatniego liścia) (BBCH 20– 39).

Środek może być stosowany jednorazowo lub w dawce dzielonej wg następującego schematu:

1. zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 20-29),

2. zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny jęczyzek ostatniego liścia) (BBCH 30-39).

Zalecane dawki środka:

1. zabieg - 1,875 l/ha, 2. zabieg - 1,875 l/ha

lub

1. zabieg - 1,75 l/ha, 2. zabieg – 2,0 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 150- 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 w przypadku zastosowania w dawce dzielonej)

### Pszenica jara

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny jęczyzek ostatniego liścia) (BBCH 20– 39).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

### **Żyto ozime**

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20– 39).

Środek może być stosowany jednorazowo lub w dawce dzielonej wg następującego schematu:

1. zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 20-29),
2. zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 30-39).

Zalecane dawki środka:

1. zabieg - 1,875 l/ha, 2. zabieg - 1,875 l/ha

lub

1. zabieg - 1,75 l/ha, 2. zabieg – 2,0 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 w przypadku zastosowania w dawce dzielonej).

### **Pszenżyto ozime**

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20– 39).

Środek może być stosowany jednorazowo lub w dawce dzielonej wg następującego schematu:

1. zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 20-29),
2. zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 30-39).

Zalecane dawki środka:

1. zabieg - 1,875 l/ha, 2. zabieg - 1,875 l/ha

lub

1. zabieg - 1,75 l/ha, 2. zabieg – 2,0 l/ha

Zezwolenie MRiRW – Stabilan 400 SL

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 w przypadku zastosowania w dawce dzielonej)

**załącznik nr 9 - ZASTOSOWANIA MAŁOBSZARWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN**

**STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH  
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

*Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.*

**Pszenica twarda ozima**

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20–39).

Środek może być stosowany jednorazowo lub w dawce dzielonej wg następującego schematu:

1. zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 20-29),
2. zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 30-39).

Zalecane dawki środka:

1. zabieg - 1,875 l/ha, 2. zabieg - 1,875 l/ha

lub

1. zabieg - 1,75 l/ha, 2. zabieg – 2,0 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 w przypadku zastosowania w dawce dzielonej).

### **Pszenica twarda jara**

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20–39).

Środek może być stosowany jednorazowo lub w dawce dzielonej wg następującego schematu:

1. zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 20-29),
2. zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 30-39).

Zalecane dawki środka:

1. zabieg - 1,875 l/ha, 2. zabieg - 1,875 l/ha

lub

1. zabieg - 1,75 l/ha, 2. zabieg – 2,0 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 w przypadku zastosowania w dawce dzielonej).

### **Pszenica orkisz**

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować wiosną, od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20–39).

Środek może być stosowany jednorazowo lub w dawce dzielonej wg następującego schematu:

1. zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 20-29),
2. zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 30-39).

Zalecane dawki środka:

1. zabieg - 1,875 l/ha, 2. zabieg - 1,875 l/ha

lub

1. zabieg - 1,75 l/ha, 2. zabieg – 2,0 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 w przypadku zastosowania w dawce dzielonej).

### **Żyto jare**

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 20–39).

Środek może być stosowany jednorazowo lub w dawce dzielonej wg następującego schematu:

1. zabieg wykonać od początku do końca fazy krzewienia (BBCH 20-29),
2. zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek ostatniego liścia) (BBCH 30-39).

Zalecane dawki środka:

1. zabieg - 1,875 l/ha, 2. zabieg - 1,875 l/ha

lub

1. zabieg - 1,75 l/ha, 2. zabieg – 2,0 l/ha

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 w przypadku zastosowania w dawce dzielonej).

### Uzasadnienie

W zezwoleniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-12/2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Stabilan 400 SL omyłkowo w załączniku nr 2, dotyczącym stosowania środka, w zastosowaniach pszenicy ozimej, życie ozimym oraz pszenżycie ozimym, w dawce w drugim zabiegu, a

także w załączniku nr 9, dotyczącym stosowania środka w uprawach małoobszarowych, w zastosowaniach pszenicy twardej ozimej, pszenicy twardej jarej, pszenicy orkisz oraz życie jarym, w dawce w drugim zabiegu podano niepełny zapis jednostki miary tj. „/ha”, a powinno być „l/ha”.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki pisarskie w wydanych przez ten organ decyzjach. W związku z powyższym, postanowiono o sprostowaniu powyższej omyłki.

Na podstawie art. 113 § 3, w związku z art. 144 i art. 127 § 3 k.p.a., strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi wynosi 200 zł.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Małgorzata Flaszka  
zastępca dyrektora  
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin  
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje(za zwrotnym dowodem doręczenia - ePUAP):

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
([wo@piorin.gov.pl](mailto:wo@piorin.gov.pl))

Instytut Ochrony Roślin – PIB  
([decyzje.sor@iorpib.poznan.pl](mailto:decyzje.sor@iorpib.poznan.pl))

Instytut Ogrodnictwa  
([ochrona.roslin@inhort.pl](mailto:ochrona.roslin@inhort.pl))