



Literatura:

1. Zatoński WA, Zatoński M. Poland's rapid lung cancer decline in the years 1990-2016. The first step towards the eradication of lung cancer in Poland. *Health Prob Civil* 2017; 11(4): 211-225.
2. Zatoński WA, Zatoński M, Janik-Konieczny K, Połtyn-Zaradna K, Wijatkowska K, Marciniak A. Hundred years of cigarette smoking in Poland: three phases of the tobacco epidemic. *J Health Inequal* 2017; 3(2): 118-122.
3. Zatoński WA, Tukiendorf A and HPF team. Lung cancer mortality decline among middle-aged men and women in Poland and the UK. *J Health Inequal* 2017; 3(2): 123-126.
4. Zatoński W. Droga do zdrowia. Historia przeciwdziałania chorobom odytoniowym w Polsce. Fundacja Promocja Zdrowia, Warszawa 2004.
5. Szamotulska K, Brzeziński ZJ. Palenie tytoniu przez kobiety ciężarne a stan biologiczny noworodka w Polsce. *Alkohol Narkom* 2000; 13(3): 389-398.
6. Państwowa Inspekcja Sanitarna. Raport z badania – zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Warszawa 2017.
7. Adamek R, Florek E, Piekoszewski W, Anholcer A, Kaczmarek E. Wpływ narażenia na dym tytoniowy oraz wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na występowanie małej urodzeniowej masy ciała. *Przegl Lek* 2005; 62(10): 965-969. (za Seńczuk)
8. Wierzejska R, Jarosz M, Sawicki W, Stelmachow J, Siuba M. Antyzdrowotne zachowania kobiet ciężarnych. Tytoń, alkohol, kofeina. *Żyw Człow* 2011; 38(2): 84-98.
9. Pirogowicz I, Gryboś-Jagielska A, Patyk M, Popecki P, Pirogowicz A. Narażenie kobiet w ciąży na dym tytoniowy – badania porównawcze w odstępnie 5-letnim (2005 i 2010 r.). *Family Medicine & Primary Care Review* 2012; 14(3): 417-419.
10. Wojtyła C, Wojtyła-Buciora P. Cigarette smoking among pregnant women in Poland. *J Health Inequal* 2017; 3(1): 47-50.
11. Korzeniowska K, Cieślęwicz A, Pawlaczyk M, Pawlaczyk M, Jabłeczka A. Postawy kobiet ciężarnych i ich otoczenia wobec nałogu palenia tytoniu. *Farmacja Współczesna* 2013; 6: 163-167.
12. Adamek R, Adamek AM, Zysnarska M, Kara Izabella, Gromadecka-Sutkiewicz M, Więckowska B, Kalupa W, Maksymiuk T. Palenie papierosów w ciąży i nadciśnienie tętnicze – najsilniejszymi determinantami małej urodzeniowej masy ciała noworodków. *Hygeia Public Health* 2013; 49(2): 279-283.
13. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki. Raport "Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży". Lublin 2013
14. Lange S, Probst Ch, Rehm J, Popova A. National, regional, and global prevalence of smoking during pregnancy in the general population: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Glob Health* 2018; 6(7): e769-e776.