

Uwaga - osy, pszczoły, szerszenie

Kilka porad, jak ochronić się przed użądleniem:

1. Gdy zbliża się do Ciebie pszczoła, osa lub szerszeń unikaj gwałtownych ruchów.
2. W razie ataku osłoń głowę rękami lub odzieżą, a z niebezpiecznej okolicy oddalaj się powoli; najlepiej schronić się w ciemnym pomieszczeniu - pszczoły wylecą do światła.
3. Gdy koło Ciebie ktoś został użądłony, staraj się oddalić z tą osobą co najmniej na 50 metrów - inne owady mogą przybyć na pomoc atakującemu i użądlić ponownie.
4. Przebywaj z dala od kwitnących roślin i dojrzałych, opadłych na ziemię owoców.
5. Przed wyjściem z domu nie używaj mocno perfumowanych kremów, dezodorantów, szamponów, płynów po goleniu itp.
6. Unikaj wzorzystej, jaskrawej i lejącej się odzieży - ubieraj się raczej w biel, zieleń lub beż. Utrzymuj szczelnie zamknięte pojemniki z odpadkami i resztkami żywności.
7. Staraj się nie jeść na wolnym powietrzu słodkich owoców, marmolady, miodu czy dżemu.
8. Nie chodź boso po łące - pszczoły lubią zbierać miód na kwiatkach koniczyny.
9. Pot i dwutlenek węgla przyciągają żądłące owady, więc przy gimnastyce lub innej aktywności ruchowej na świeżym powietrzu powstaje największe niebezpieczeństwo użądlenia.

Gdy użądli pszczoła, osa, szerszeń?

Najczęściej użądłonymi miejscami u człowieka są kończyny górne i twarz. Reakcja organizmu na jad może być bardzo różna i zależy od wielu czynników: od ilości wstrzykiwanego jadu, która to wiąże się z liczbą użądleń, od owada, od miejsca ukłucia oraz od indywidualnej wrażliwości organizmu człowieka. U większości osób występują po użądleniu tylko reakcja miejscowa tj. ból, pieczenie, opuchlizna, która zwykle utrzymuje się do 2 dni. Nie mniej jednak u około 30% ludzi mogą pojawiać się objawy reakcji ogólnej wskazujące na uczulenie na jad. Dawka 300 użądleń przez pszczoły powoduje ciężkie zatrucie organizmu, a 500 jest dawką śmiertelną.

Gdy użądli pszczoła to pozostawia ona swój sztylet żądła w ciele ofiary wraz z oderwanym aparatem jadowym, dlatego w takim przypadku należy jak najszybciej usunąć żądło. Należy podważyć go paznokciem lub ostrzem noża, a najlepiej zeszkrobać prowadząc narzędzie od miejsca wbicia szczecinek w skórę ku aparatowi jadowemu. Chodzi o to aby jak najszybciej przerwać wnikanie jadu do ciała. Chwytając palcami można wtłoczyć zawartość zbiorniczka jadowego do ciała.

Jeżeli użądli osa czy szerszeń, który należy również do rodziny osowatych nie pozostawiają żądła w ciele ofiary. Użądlenia przez szerszenie mogą być niebezpieczne i bolesne ze względu na rozmiary żądła i ilość jadu. Osa ma również dłuższe żądło od pszczoły i w dodatku siada w różnych brudnych miejscach co może być przyczyną infekcji.

Postępowanie po użądleniu.

Nie ma sposobu na zneutralizowanie jadu, który został już wprowadzony do organizmu. Możemy jedynie łagodzić skutki użądlenia, stosując środki zmniejszające odczyn zapalny. Do prostych środków farmakologicznych należy Altacet, można sporządzić okład z zimnej wody, oziębic miejsce użądlenia metalowym przedmiotem czy lodem lub w celu odkażenia przemyć okolice użądlenia wodą utlenioną bądź jodyną, wetrzeć maść antyhistaminową. Można też podać preparaty wapniowe doustne np Thenaldin calcium oraz preparat pobudzający akcję serca np. Kardiamid z kofeiną. Gdy oprócz objawów miejscowych występują także bóle głowy, dreszcze, podniesienie ciepłoty ciała, a także zaburzenia ze strony układu krążenia i oddychania konieczna jest pomoc lekarza.

Należy wiedzieć że:

- opędzanie się i gwałtowne ruchy rozdrażniają pszczoły
- w razie ataku pszczół czy innych owadów (osy, szerszenie) osłonić głowę i twarz
- przed pszczołami schronić się ciemnym pomieszczeniu
- gnienie pszczół powoduje ich rozdrażnienie, roznoszący się zapach jadu mobilizuje ich do ataku

agresję pszczół wywołuje silny zapach potu, perfum, alkoholu.