
























Protective Vaccination Program *valid from 01.01.2022*

MANDATORY VACCINATIONS FOR CHILDREN AND TEENAGERS BY AGE

Year of birth		Tuberculosis	Rotaviruses ¹	HEP type B*	Diphtheria, tetanus, whooping cough	Diphtheria, tetanus	HIB**	IPV***	Pneumococci	Measles, mumps, rubella
2022	First 24 hours (prior to discharge from ward)									
	2 months old (after completing 6 weeks)									
	4 months old		4 weeks after the previous vaccination		after the end of the 14th week - after the 8th week from the previous vaccinations					
	5-6 months old		4 weeks after the previous vaccination		8 weeks after the previous vaccination					
	7 months old									
2021	13 -15 months old									
	16-18 months old									
2017 (after the age of 5)										
2013 (after the age of 9) MEASLES, MUMPS, RUBELLA		Vaccination for children born in 2013 and earlier, who did not receive 2 doses of the vaccine.								
2009 (after the age of 13)										
2004 (after the age of 18)										























¹ It is recommended that the complete immunization schedule be completed before the age of 22 weeks

* Hep B means hepatitis B

** Hib represents Haemophilus influenzae type b invasive infection

*** IPV stands for poliomyelitis, i.e. acute childhood paralysis

Програма обов'язкових профілактичних щеплень **чинна від 01.01.2022 року**

Рік народження		туберку льоз	Ротавірус ¹	гепатит В	Дифтерія, правець, кашлюк	Дифтерія, правець	ХІВ – інфекція **	Поліомієліт ***	Пневмококова інфекція	Кір, паротит, раснуха
2022	1 доба (перед виходом з відділення)									
	2 місяць життя (після закінчення 6 тижня життя)									
	4 місяць життя		через 4 тижні після попередньої дози		після закінчення 14 т. ж. - через 8 тижнів після попередньої дози					
	5-6 місяців		через 4 тижні після попередньої дози		через 8 тижнів після попередньої дози					
	7 місяць життя									
2021	13 - 15 місяць життя									
	16 - 18 місяць життя									
2017 (після закінчення 5 року життя)										
2013 (після закінчення 9 року життя) КІР, ЕПІДЕМІЧНИЙ ПАРОТИТ, КРАСНУХА		Вакцинація для дітей 2013 р.н. і раніше, які не отримали 2 дози вакцини.								
2009 (після закінчення 13 року життя)										
2004 (після закінчення 18 року життя)										

¹ Рекомендується завершити повну схему вакцинації до досягнення 22-тижневого віку

** гемофільна інфекція типу В позначає інвазію зараження *Haemophilus influenzae* типу b

*** позначає дитячий спинальний параліч