

Posiadacz zezwolenia:

BROS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel.: 61 826 25 12,
fax: 61 820 08 41, e-mail: biuro@bros.pl, www.bros.pl

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej:

PROCAM Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk, tel. 58 762 80 35,
www.procam.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

.....

SIMAROL GB na ślimaki

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

Metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu octowego) - 50 g/kg (5%).

Zezwolenie MRiRW nr R-112/2017 z dnia 19.06.2017 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-566/2024d z dnia 23.05.2024 r.



Uwaga

- H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
- EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
- P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
- P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
- P308+P313 W przypadku narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- P405 Przechowywać pod zamknięciem

Preparat niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych. W przypadku podejrzenia spożycia przez zwierzęta, natychmiast skontaktować się z lekarzem weterynarii.

OPIS DZIAŁANIA

Moluskocyd w formie granulowanej przynęty do zwalczania ślimaków w niektórych uprawach rolniczych oraz w roślinach ozdobnych w uprawie polowej i pod osłonami. Wabi ślimaki i jest chętnie przez nie zjadany. Działa żołądkowo i kontaktowo. Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu ręcznych i mechanicznych aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rośliny rolnicze: rzepak ozimy, pszenica ozima

ślimaki nagie np. pomrowiki, śliniki

- w rzepaku – po siewie do fazy 5 liścia (BBCH 15),

- w pszenicy – po siewie do fazy 4 liścia (BBCH 14).

Środek rozsypywać równomiernie na polu, np. aplikatorem do granulowanych środków ochrony roślin.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Funkia, aksamitka i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami)

ślimaki nagie i oskorupione np. śliniki, wstężyki

Termin stosowania: Środek stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki.

Środek rozsypywać równomiernie np. aplikatorem do granulowanych środków ochrony roślin na całej powierzchni gleby między roślinami i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać roślin uprawnych.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/1000 m²

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Przed zastosowaniem na glebę gruboziarnistą, zalecane jest jej wyrównanie, aby granulat nie wniknął w szczeliny i pozostał łatwo dostępny dla ślimaków.
2. Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych lub wieczornych.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z preparatem.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0 °C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji i nr serii na opakowaniu.

Zawartość netto -