


INSTRUKCJA POBRANIA PRÓBEK KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA PAŁECZEK Z RODZAJU SALMONELLA/SHIGELLA

Do badania należy pobrać 3 próbki kału przez trzy kolejno następujące po sobie dni (np. sobota, niedziela, poniedziałek). Każdego dnia pobieramy jedną próbkę, a następnie dostarczyć w dniu pobrania trzeciego wymazu.

Wskazane jest pobranie wymazu po oddaniu stolca. W celu pobrania wymazu z odbytu należy delikatnie wprowadzić wymazówkę do odbytu i parokrotnie obrócić wymazówką. Następnie należy umieścić wymazówkę z pobranym materiałem w probówce z podłożem transportowym. Wymaz z odbytu jest prawidłowo pobrany, gdy na wymazówce widoczny jest ślad kału.

Uwaga: wystarczy śladowa ilość kału, nie ma potrzeby pobierania na wymazówkę większej ilości kału. **SZCZELNIE ZAMKNIĘTA PROBÓWKĘ OPISUJEMY SWOIM IMIENIEM I NAZWISKIEM WRAZ Z DATA URODZENIA, DATA POBRANIA I GODZINĄ POBRANIA MATERIAŁU.** Należy pobierać próbki w taki sam sposób przez dwa kolejne dni, za każdym razem opisując probówkę. Probówki z pobranym materiałem należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Wszystkie 3 próbki należy dostarczyć do punktu pobrań w dniu pobrania ostatniej trzeciej próbki. Dopuszczalny czas pomiędzy pobraniem pierwszej próbki a dostarczeniem do punktu pobrań wszystkich trzech próbek nie powinien być dłuższy niż 72h.

DZIEŃ 1 – wymazówka nr 1	DZIEŃ 2 – wymazówka nr 2	DZIEŃ 3 – wymazówka nr 3
<ul style="list-style-type: none">kał oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytkuza pomocą wymazówki pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału tak, aby materiał był wyraźnie		
		
<ul style="list-style-type: none">jeżeli próbka nie będzie zawierała dostatecznej ilości materiału nie zostanie przyjęta w laboratoriumwymazówkę włożyć do probówki z podłożem transportowym, dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany oraz datą i godziną pobrania.pobrane próbki przechowywać w temperaturze lodówki (2 – 8°C). PRÓBEK NIE NALEŻY ZAMRAŻAĆ!		
<p>UWAGA: Nie pobierać kału w trakcie terapii antybiotykowej oraz przed upływem 7 dni od jej zakończenia!</p>		