

**WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY**  
**DZIAŁ LABORATORYJNY - ODDZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ**

Wyciąg z załącznika nr 5 do PL-02/IR-01/LM wydanie 2 załącznika z dnia 2023-10-02

**2. Badania parazytologiczne**

**2.1. Pobieranie i transport próbek kału w kierunku pasożytów przewodu pokarmowego**

Kał należy oddać do czystego naczynia. Próbkę należy pobierać za pomocą łopatkı dołączonej do pojemnika transportowego. Należy zapełnić próbką połowę pojemnika na kał, zarówno w przypadku stolców o konsystencji stałej i płynnej.

Kał należy pobierać z trzech różnych miejsc wypróżnienia. Należy pobrać widoczną krew, śluz lub ropę, jeśli są w kale.

Badanie kału w kierunku pasożytów przewodu pokarmowego należy wykonać trzykrotnie w odstępach min 3-5 dni.

Po pobraniu próbkę należy dostarczyć do WSSE możliwie jak najszybciej. W razie braku takiej możliwości przechowywać w temp.  $2-8^{\circ}\text{C}\pm 1$ , lecz nie dłużej niż 24 h. Próbkı kału w kierunku wykrywania pasożytów tropikalnych należy dostarczyć w czasie nieprzekraczającym 1 h od pobrania i transportować w temperaturze pokojowej.