

**WYKAZ CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ, PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SŁUŻBIE CELNO-SKARBOWEJ I SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA, Z TYTUŁU KTÓRYCH FUNKCJONARIUSZOWI PRZYŚLUGUJE JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE**

Poz.	Nazwa choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby	Szczególne warunki lub właściwości służby wywołujące chorobę
1.	PTSD – zespół stresu pourazowego	Przeżycie wydarzenia o charakterze katastrofalnym, wyjątkowo zagrażającym życiu. Reakcja na stres powodujący kryzys psychiczny odroczone lub przedłużone w czasie. Objawy występują po krótkiej przerwie od zadziałania stresora. Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych powinien wynosić do 6 miesięcy od zdarzenia.
2.	Zaburzenia osobowości	Trwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej, katastrofalnej lub po chorobie psychicznej egzogennej.
3.	<b>Zaburzenia lękowe:</b> 1) fobie 2) zespół lęku uogólnionego 3) zespół lęku panicznego 4) zaburzenia mieszane depresyjno-lękowe nawracające 5) zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne	Długotrwałe i nadmierne napięcie nerwowe lub emocjonalne, wywołujące ujawnienie się i/lub zaostrzenie kompensowanych dotąd wad psychicznych, uspasabiające do nawarstwienia reakcji nerwicowych. Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych powinien wynosić do 1 roku, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
4.	Psychozy reaktywne odporne na leczenie	Ostry stres spowodowany zdarzeniami w czasie pełnienia służby. Ostry początek choroby – wystąpienie objawów chorobowych do 2 tygodni od zdarzenia.
5.	Organiczne zaburzenia psychiczne	Urazy i zatrucia (także mikrourazy i zatrucia podprogowe), neuroinfekcje zaistniałe podczas pełnienia służby wywołujące ujawnienie się reakcji psychotycznych.
6.	Zatrucia ostre lub przewlekłe substancjami chemicznymi lub ich następstwa	Narażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych. Czas wystąpienia objawów chorobowych powinien wynosić: – dla zatruc ostrych – do 3 dni od zatrucia, – dla zatruc przewlekłych – nie określa się.
7.	Wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące przewlekłe trwałe obturacyjne zapalenie oskrzeli, powodujące trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej	Długotrwałe, trwające minimum rok, narażenie na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par, aerozoli o właściwościach duszących, drażniących w środowisku służby.

8.	<b>Astma oskrzelowa z wyłączeniem astmy o podłożu alergicznym</b>	Długotrwałe, trwające minimum rok, narażenie na dymy, pyły, aerozole, substancje chemiczne i izocyjaniany. Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 1 roku, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
9.	<b>Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:</b>	Narażenie na czynniki alergizujące. Czas wystąpienia objawów powinien wynosić, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe, do:
	1) postać ostra	1–3 dni.
	2) postać przewlekła	3 lat.
10.	<b>Pylice i inne choroby śródmiąższowe płuc przebiegające z włóknieniem</b>	Długotrwałe narażenie na wdychanie pyłów pochodzenia organicznego i nieorganicznego, które mogą wywołać włóknienie tkanki płucnej.
11.	<b>Ostre uogólnione reakcje alergiczne</b>	Narażenie na substancje silnie uczulające. Czas wystąpienia objawów powinien wynosić 1 dzień.
12.	<b>Alergiczny nieżyt nosa lub astma o podłożu alergicznym</b>	Występujące w środowisku służby narażenie na związki akrylowe, amoniak, antymon i jego związki, arsen, selen, tlenki azotu, beryl, chlor, związki siarki, chromiany, bezwodnik ftalowy, furfuroł, tlenek kadmu, kobalt, mangan, naftę i mieszaniny węglowodorów, terpentynę, pirydynę, pięciotlenek wanadu. Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych powinien wynosić do 1 roku, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
13.	<b>Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym</b>	Długotrwałe, trwające minimum rok, narażenie na czynniki chemiczne o działaniu żrącym lub drażniącym. Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych powinien wynosić do 1 roku, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
14.	<b>Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym</b>	Służba w narażeniu na czynniki alergizujące występujące w środowisku służby szkodliwym dla zdrowia. Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych powinien wynosić do 1 roku, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
15.	<b>Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:</b>	Narażenie na nadmierne, długotrwałe obciążenie narządu głosu (np. wykładowcy, telefoniści, dyspozytorzy).
	1) guzki głosowe twarde	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych powinien wynosić do 2 lat, także
	2) wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych	

	3) niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią	pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
16.	<b>Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:</b>	Narażenie na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych.
	1) ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych powinien wynosić do 2 miesięcy od narażenia, także po jego ustąpieniu.
	2) ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych powinien wynosić do 2 miesięcy od narażenia, także po jego ustąpieniu.
	3) przewlekłe popromienne zapalenie skóry	Czasu wystąpienia udokumentowanych objawów nie określa się.
	4) przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego	Czasu wystąpienia udokumentowanych objawów nie określa się.
	5) zaćma popromienna	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 10 lat, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	6) nowotwory złośliwe dla których prawdopodobieństwo indukcji przez promieniowanie jonizujące przekracza 10%.	Czas wystąpienia określa się indywidualnie po oszacowaniu ryzyka.
17.	<b>Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku służby, uznanych za rakotwórcze u ludzi:</b>	Narażenie na długotrwałą styczność z chemicznymi czynnikami rakotwórczymi, np. produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych, smołowców i innych. Narażenie na działanie czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym.
	1) rak płuca, rak oskrzela	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych określa się indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu.
	2) międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej	
	3) nowotwór układu krwiotwórczego	
	4) nowotwór skóry	
	5) nowotwór pęcherza moczowego	
	6) nowotwór wątroby	
	7) rak krtani, nowotwór nosa i zatok przynosowych	
Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg poz. 16 pkt 6.		
18.	<b>Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:</b>	Działanie ujemnych albo bardzo wysokich temperatur.
	1) udar cieplny albo jego następstwa	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 1 roku, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	2) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa,	
3) odmroziyny		
19.	<b>Choroby wywołane służbą w warunkach zmiennego ciśnienia atmosferycznego lub</b>	Podwyższone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne narażające na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania przeciążeń grawitacyjnych (np. nurkowie, piloci).



	<b>wywołane działaniem przeciążeń grawitacyjnych (przyspieszeń):</b>	
	1) choroba dekompresyjna	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 5 lat, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	2) urazy ciśnieniowe	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 3 dni, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	3) następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 3 dni, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
<b>20.</b>	<b>Zespół wibracyjny:</b>	Długotrwałe narażenie na działania drgań mechanicznych (wibracje).
	1) postać naczyniowo-nerwowa	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w postaci naczyniowo-nerwowej do 1 roku, w pozostałych wynosi do 3 lat, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	2) postać kostno-stawowa	
	3) postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa	
<b>21.</b>	<b>Przewlekłe choroby układu ruchu oraz obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania czynności służbowych:</b>	Długotrwałe obciążenie ograniczonych grup mięśni, wymuszona postawa ciała lub narażenie na często powtarzające się mikrourazy albo powodujące ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie (np. u stenografów, maszynistek) oraz narażenie na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego. Występuje, kiedy działanie mechaniczne przekracza wytrzymałość fizyczną lub wydolność czynnościową elementów dynamiczno-statycznych. Czynności służbowe wykonywane długotrwałe, charakteryzujące się powtarzalnością, rytmicznością, wymuszoną pozycją, uciskiem lub rozciąganiem określonych elementów narządu.
	1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki,	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 1 roku, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej	
	3) przewlekłe uszkodzenie łokotki lub uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących czynności służbowe w pozycji kucznej lub kłęzącej	
	4) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku	
	5) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej	
	6) zmęczeniowe złamanie kości	
	7) martwica kości nadgarstka	
	8) zespół cieśni w obrębie nadgarstka	
	9) zespół kanału Guyona	
	10) zespół rowka nerwu łokciowego	
<b>22.</b>	<b>Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkość co najmniej o 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1 kHz, 2 kHz i 3 kHz</b>	Narażenie na długotrwałe, trwające minimum 3 lata, działanie hałasu o dużej intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach przekraczające obowiązujące normy narażenia na hałas. Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 2 lat, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
<b>23.</b>	<b>Choroby narządu wzroku wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi</b>	Narażenie na długotrwałe działanie promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego generowanego

		przez układy laserowe, drażniących substancji chemicznych. Długotrwałe wykonywanie czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na zminiaturyzowanych elementach lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia oraz obsługa elektronicznych monitorów ekranowych.
	1) alergiczne zapalenie spojówek	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 1 roku, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	2) ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi 1 dzień, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	3) epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 1 roku, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	4) zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 3 lat, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	5) zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 10 lat, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	6) centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 3 lat, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
24.	<b>Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa. Choroby powstałe w wyniku powikłań szczepień ochronnych, wykonanych w związku ze służbą na określonym stanowisku, zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia, osierdzia w przebiegu chorób o etiologii bakteryjnej, wirusowej lub pasożytniczej (dot. również gruźlicy)</b>	Bezpośrednie stykanie się z zakaźnym środowiskiem i materiałem biologicznym. Szczepienia ochronne wykonane na zlecenie właściwych organów w związku z zagrożeniami wynikającymi z warunków służby. Trudne warunki atmosferyczne, polowe, niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu.
25.	<b>Zaawansowana przewlekła niewydolność żylna kończyn dolnych – stadium minimum C4B wg klasyfikacji CEAP</b>	Długotrwała (trwająca ponad połowę dobowego wymiaru czasu służby w okresie powyżej 5 lat) służba w pozycji stojącej lub przymusowej.
26.	<b>Choroby skóry:</b>	
	1) alergiczne kontaktowe zapalenie skóry	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 1 miesiąca, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	2) kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 1 miesiąca, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	3) trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 1 miesiąca, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.

	4) drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób wykonujących służbę w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 1 miesiąca, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	5) grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 1 miesiąca, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
	6) fotodermatozy zawodowe	Czas wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych wynosi do 3 lat, także pomimo ustąpienia ekspozycji na czynniki szkodliwe.
<p><b>Uwaga:</b> Ilekroć w tabeli mowa jest o czasie wystąpienia udokumentowanych objawów, należy przez to rozumieć czas, w jakim powinny ujawnić się objawy chorobowe, aby możliwym było stwierdzenie związku ze służbą i jej szczególnymi właściwościami lub warunkami.</p>		