

Szczepionki przeciw odrze w Programie Szczepień Ochronnych

Szczepionki przeciw odrze w Programie Szczepień Ochronnych

Szczepienia przeciw odrze wykonuje się skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce.

Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce są obowiązkowe (finansowane z budżetu Ministra Zdrowia) dla dzieci

w schemacie szczepienia:

- podstawowego w 13-15 miesiącu życia,
- uzupełniającego w 10 roku życia.

Dzieciom powyżej 10 roku życia, które nie otrzymały dwóch dawek szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce należy uzupełnić brakującą dawkę szczepionki, nie później niż do ukończenia 19 roku życia.

Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce są zalecane (niefinansowane z budżetu Ministra Zdrowia) osobom:

- nieszczepionym przeciw odrze, śwince i różyczce w ramach szczepień obowiązkowych, dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 4 tygodni,
- młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie) i młodym mężczyznom dla zapobiegania różyczce wrodzonej szczególnie nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych.

Podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy je podać nie wcześniej niż po upływie 4 tygodni od wyzdrowienia.

Nie zaleca się podawania szczepionki w okresie ciąży, a przez 1 miesiąc po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.

Jak szczepionka przeciw odrze była stosowana w przeszłości?

1963 – opracowanie pierwszej szczepionki przeciw odrze,

1975 – wprowadzenie w Polsce obowiązkowych szczepień przeciw odrze dzieci w 12-15 miesiącu życia (1 dawka szczepionki),

1988 – wprowadzenie do użytku szczepionki MMR w Wielkiej Brytanii,

1989 – wprowadzenie szczepienia przeciw różyczce dziewczynek w wieku 13 lat,

1991 – objęcie obowiązkowymi szczepieniami przeciw odrze (druga dawka szczepionki) dzieci w wieku 8 lat,

1994 – przesunięcie drugiej dawki szczepionki przeciw odrze na dzieci w wieku 7 lat,

2004 – wprowadzenie dwu dawkowego schematu szczepienia skojarzoną szczepionką MMR w 13-14 miesiącu życia oraz w 10 roku życia,

2004 – wprowadzenie przypominającej dawki szczepionki MMR dziewczętom w 11, 12 i 13 roku życia, które nie były szczepione przeciw różyczce.