



ODRA




PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA OSTRZEGA - ODRA POWRACA

CZY WIESZ, ŻE...

- ODRA jest 6 razy bardziej zaraźliwa niż GRYPA.
- Okres wylegania : 8-13 dni od zarażenia.



Dwie dawki szczepionki przeciw odrze zapewniają niemal **100 % ochronę** przed tą chorobą.



● Drogi przenoszenia:

- kropelkowa** - katar, kaszel
- kontaktowa** - wirus przeżywa do 2 godzin na powierzchniach.

- chory zakaża otoczenie już **3-4 dni** przed pierwszymi objawami i zakaźny pozostaje **do 5 dni** od momentu wystąpienia wysypki.

JEDEN CHORY MOŻE ZARAZIĆ 9 NA 10 OSÓB ZE SWOJEGO OTOCZENIA. CHORUJĄ GŁÓWNIENIE OSOBY NIEZASZCZEPIONE LUB ZASZCZEPIONE TYLKO JEDNĄ DAWKĄ, ZARÓWNO DZIECI JAK I DOROŚLI.



KATAR, KASZEL



ZAPALENIE SPOJÓWEK



ŚWIATŁOWSTRĘT



GORĄCZKA



CZERWONA PLAMISTA WYSYPKA



OBJAWY

Szczepienie wykonane do 72 godzin od kontaktu z chorym daje ochronę przed zachorowaniem.

LICZBA PRZYPADKÓW ODRY	2016	2017	2018
EUROPA	5 273	21 315	82 596

LICZBA PRZYPADKÓW ODRY	2017	2018	2019
POLSKA	63	339	1492

U 1 na 5 chorych odrze będzie miała poważny przebieg lub wystąpią powikłania.

MOŻLIWE POWIKŁANIA



ZAPALENIE PŁUC



ZAPALENIE WĄTROBY



ZAPALENIE MÓZGU



SSPE



BIEGUNKA ODWODNIENIE



ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO
UTRATA SŁUCHU



ŚMIERĆ

NIE MA SPECYFICZNEGO LEKU PRZECIWKO ODRZE.