

## Kontakt (narażenie) z osobą chorą na gorączkę krwotoczną Ebola (ang. EVD Ebola Virus Disease):

1. *narażenia wysokiego ryzyka obejmują:*
  - przezskórne (np. ukłucie igłą) lub poprzez błony śluzowe narażenie na płyny ustrojowe pacjenta chorego na EVD,
  - bezpośrednia opieka lub ekspozycja na płyny ustrojowe pacjenta chorego na EVD, bez odpowiedniej ochrony osobistej (ang. personalprotectiveequipment – PPE),
  - personel laboratoryjny pracujący z płynami ustrojowymi pacjenta chorego na EVD bez odpowiedniej ochrony osobistej (PPE) lub bez przestrzegania odpowiednich wymogów bezpieczeństwa biologicznego,
  - uczestniczenie w obrzędach pogrzebowych obejmujących bezpośredni kontakt ze zwłokami ludzkimi na obszarze, gdzie występują zachorowania na EVD, bez odpowiedniej ochrony osobistej (PPE).
2. *narażenie niskiego ryzyka obejmują:*
  - przebywanie w gospodarstwie domowym lub inny przypadkowy kontakt<sup>1</sup> z pacjentem chorym na EVD,
  - opieka nad pacjentem lub inny przypadkowy kontakt<sup>2</sup> nie obejmujący narażenia wysokiego ryzyka, z pacjentem chorym na EVD w placówce ochrony zdrowia w krajach, gdzie stwierdzono zachorowania na EVD<sup>1</sup>.
3. *narażenia o nieustalonym ryzyku obejmują:*

Każda osoba przebywająca w ciągu ostatnich 21 dni w kraju, w którym stwierdzono zachorowanie na EVD, u której nie stwierdzono zarówno narażenia o niskim ani wysokim ryzyku.

---

<sup>1</sup>Przypadkowy kontakt jest definiowany jako:

- a) Przebywanie w odległości średnio 1 metra lub w jednym pomieszczeniu lub w placówce opieki zdrowotnej przez dłuższy czas (np. personel medyczny, członkowie rodziny) bez stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), lub
- b) Znalezienie się przez krótki czas w bliskim kontakcie (np. przez uścisk ręki) z osobą zakażoną EVD bez stosowania odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE).

Definicja przypadkowego kontaktu nie obejmuje: krótkich kontaktów, takich jak przechodzenie obok pacjenta na EVD lub poruszanie się po szpitalu.