



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 04 stycznia 2023 r.

Poz. 217

### ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Rekowa”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, 1726 i 2375) zarządza się, co następuje.

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Rekowa”, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. 1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie czystej, wartkiej rzeki Rekowa z rzadką roślinnością, w tym krasnorostem *Hildenbrandtia rivularis* oraz zachowanie i utrzymanie przyległych olszowo-jesionowych lasów łągowych, grądów grabowych na zboczach i roślinności źródliskowej.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 są:

1) ochrona walorów rezerwatu:

- a) typowo wykształconych ekosystemów leśnych, tj. buczyn, grądów i łągów ze znacznym udziałem starodrzewów i okazałych drzew,
- b) ekosystemu rzeki włosienicznikowej o charakterze podgórskim z bogatą populacją *Hildenbrandtia rivularis*,
- c) ekosystemów źródliskowych z licznymi wskaźnikowymi mszakami oraz wątrobowcami,
- d) cennych gatunków flory, w tym reliktywów lasów puszczańskich m.in. populacji rzadkich i chronionych mchów: nastroszka kędzierzawego *Ulota crispa*, nastroszka Brucha *Ulota bruchii*, miechery spłaszczonej *Neckera complanata*, gładysza paprociowatego *Homalia trichomanoides*, szurpka porośłego *Orthotrichum lyellii*,
- e) zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków grzybów wielkoowocnikowych, m.in.: ozorka dębowego *Fistulina hepatica*, żagwii ciemnonogiej *Polyporus melanopus*, gołąbka fioletowonogiego *Russula violeipes*,
- f) cennych gatunków ichtiofauny będących wskaźnikami dobrego stanu ekosystemów tj. głowacza białopłetwego *Cottus gobio*, minoga strumieniowego *Lampetra planeri*, kozy *Cobitis taenia*,
- g) urozmaiconego krajobrazu wysoczyzny morenowej rozciętej głęboką, przełomową doliną rzeki Rekowej,

2) położenie rezerwatu w bliskiej odległości od miejscowości Płoty oraz drogi krajowej nr 6,

- 3) położenie rezerwatu przyrody w granicach obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049 oraz występowania w jego obrębie przedmiotów ochrony tego obszaru: nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (*Ranunculion fluitantis*) – kod 3260, żyzne buczyny (*Dentario glandulosae Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*) – kod 9130, grąd subatlantycki (*Stellario-Carpinetum*) – kod 9160, łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe 91E0, minóg strumieniowy *Lampetra planeri* – kod 1096, głowacz białopłetwy *Cottus gobio* – kod 1163, koza *Cobitis taenia* – kod 1149;
- 4) położenie rezerwatu w całości na gruntach należących do Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Resko oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie;

§ 3. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 5. Określenie działań ochronnych w rezerwacie z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6. Opis granic części obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049 pokrywającej się z rezerwatem określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 7. Mapę części obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049 pokrywającej się z rezerwatem przyrody, przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 8. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony części obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049, pokrywającej się z rezerwatem, przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 9. Cele działań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049, pokrywającej się z rezerwatem, zawiera załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 10. Działania ochronne dla części obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049, pokrywającej się z rezerwatem, określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
w Szczecinie

**Aleksandra Stodulna**

Załącznik nr 1 do zarządzenia Regionalnego  
Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla rezerwatu.

Lp.	Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych	Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych
<b>Zagrożenia wewnętrzne istniejące</b>		
1.	Obniżanie się poziomu lustra wód powierzchniowych i gruntowych.	Brak możliwości eliminacji zagrożenia w aspekcie zmian globalnych.
2.	Susze i zmniejszenie się ilości opadów.	Tendencja wieloletnia. Brak możliwości przeciwdziałania.
3.	Przesuszenie skutkujące stopniowym grądowieniem i zmianą kompozycji gatunkowej runa łągów (wzrost udziału gatunków typowych dla łągów, miejscami ekspansja pokrzywy oraz niecierpka drobnokwiatowego).	Tendencja wieloletnia. Brak możliwości przeciwdziałania.
4.	Zamieranie dębu szypułkowego <i>Quercus robur</i> , zamieranie jesionu <i>Fraxinus excelsior</i> .	Zamieranie dębów powodowane jest głównie czynnikami naturalnymi (pogłębiające się susze, wydzielanie się osobników), natomiast zamieranie jesionu związane jest ze zjawiskiem zamierania tego gatunku w całym zasięgu. Brak możliwości przeciwdziałania.
5.	Obecność gatunków obcych.	Niecierpek drobnokwiatowy obecny we wszystkich zbiorowiskach leśnych w rezerwacie. Brak tendencji inwazyjnych u stwierdzonych obcych elementów dendroflory w rezerwacie, jednak ich obecność i dynamika wymaga stałego monitoringu i ewentualnego planowania zabiegów ochrony czynnej w przyszłości. Stwierdzono ponadto pojedyncze stanowiska innych gatunków nie wykazujących tendencji do ekspansji (np.: dąb czerwony, kasztanowiec zwyczajny, moczarka kanadyjska, wierzbownica gruczołowata, czeremcha amerykańska, nawłóć kanadyjska, szczawik żółty). Punktowo w ekosystemach leśnych zaznacza się także podwyższony udział świerka pospolitego w drzewostanie (gatunek tylko nielicznie odnawiający się w łągach). Nie stwierdzono aktualnej potrzeby przeciwdziałania zagrożeniu poza ewentualnym podejmowaniem działań w sytuacjach nadzwyczajnych (faktycznego zagrożenia dla stanu sanitarnego i trwałości drzewostanów przyległych do rezerwatu). Monitorowanie dynamiki gatunków obcych.
6.	Obecność drogi krajowej – elementu przecinającego korytarz ekologiczny (ruch pojazdów stanowi przede wszystkim zagrożenie dla fauny) oraz zwiększającego ryzyko przenoszenia i rozprzestrzeniania gatunków niepożądanych.	Brak możliwości eliminacji zagrożenia. Monitorowanie dynamiki gatunków obcych i ich ewentualne usuwanie.

7.	Bariery dla migracji organizmów wodnych. Pozostałości dawnego betonowego piętrzenia utrudniają migrację organizmom wodnym, w szczególności ichtiofaunie reofilnej.	Monitoring ichtiofauny oraz zagrożeń w rezerwacie.
<b>Zagrożenia wewnętrzne potencjalne</b>		
8.	Usuwanie osadów rzecznych, rumoszu drzewnego, naruszanie skarp, ingerencja w profil podłużny lub poprzeczny rzeki.	Nieprowadzenie w granicach rezerwatu prac utrzymaniowych i regulacyjnych poza bezpośrednią eliminacją zagrożeń związanych z bezpieczeństwem powszechnym.
9.	Ekspansja gatunków obcych.	Monitoring i ew. eliminacja gatunków.
10.	Pogłębianie się problemu suszy i dalsze obniżanie poziomów wód.	Brak możliwości przeciwdziałania w aspekcie zmian globalnych. Ocena wpływu inwestycji i działań mogących wpływać na warunki wodne w rezerwacie.
<b>Zagrożenia zewnętrzne istniejące</b>		
11.	Susze i zmniejszenie się ilości opadów.	Tendencja wieloletnia o negatywnym wpływie na warunki hydrologiczne w dolinie Rekowej. Brak możliwości przeciwdziałania zagrożeniu.
12.	Obniżanie się poziomu lustra wód gruntowych i powierzchniowych.	Tendencja wieloletnia o negatywnym wpływie na warunki hydrologiczne w dolinie Rekowej. Brak możliwości przeciwdziałania zagrożeniu.
13.	Penetracja rezerwatu związana z jego zaśmiecaniem, zbiorem owoców runa leśnego wydeptywaniem i niszczeniem (zrywaniem) roślinności, płoszeniem zwierząt.	Ograniczenie zagrożenia w graniach rezerwatu polegające na prawidłowym oznakowaniu rezerwatu oraz utrzymaniu jego sprawności technicznej (konserwacji) oraz wzmożonej kontroli służb ochrony przyrody oraz zarządców terenu w zakresie przestrzegania zakazów obowiązujących w obiekcie.
<b>Zagrożenia zewnętrzne potencjalne</b>		
14.	Inwazja gatunków obcych.	Brak możliwości całkowitego przeciwdziałania zagrożeniu. Monitoring przyrodniczy i ew. eliminacja gatunków.
15.	Usuwanie osadów rzecznych, rumoszu drzewnego, naruszanie skarp, ingerencja w profil podłużny lub poprzeczny rzeki.	Brak bezpośredniej możliwości eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zlokalizowanych poza granicami rezerwatu poprzez ustalenia planu ochrony. Eliminacja lub ograniczenie zagrożenia powinna odbywać się na bieżąco w oparciu o przepisy szczegółowe dotyczące prac utrzymaniowych oraz regulacji wód, w szczególności art. 118 ustawy o ochronie przyrody oraz przepisy ustawy Prawo wodne z uwzględnieniem dobrych praktyk w tym zakresie.
16.	Zanieczyszczenia wód pochodzące ze spływu powierzchniowego z drogi krajowej.	Monitoring zagrożeń w rezerwacie i ewentualne działania zapobiegawcze.
17.	Wydobywanie kopalín w sąsiedztwie rezerwatu – zaburzenia stosunków hydrologicznych.	Ocena wpływu nowych inwestycji i działań mogących wpływać na warunki wodne w rezerwacie.
18.	Zaburzenie warunków wodnych oraz możliwości migracji organizmów wodnych związane z piętrzącą i tamującą działalnością bobrów.	Monitoring zagrożeń w rezerwacie i ewentualne działania zapobiegawcze.

Załącznik nr 2 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji dla rezerwatu.

Lp.	Rodzaj działań	Zakres działań	Lokalizacja
1.	Kontrola rezerwatu pod kątem występowania gatunków obcych oraz ich eliminacja w przypadku ekspansji.	Kontrola/monitoring występowania i dynamiki gatunków obcych (m.in.: niecierpka drobnokwiatowego, dębu czerwonego, świerka pospolitego czeremchy amerykańskiej, wierzbownicy gruczołowatej, moczarki kanadyjskiej, nawłoci późnej i kanadyjskiej). Założenie co najmniej 5 stałych powierzchni monitoringowych (transektów) o wymiarach dostosowanych do danego gatunku oraz typu ekosystemu (1 transekt powinien obejmować ekosystem wodny, 2 powierzchnie należy założyć w sąsiedztwie drogi krajowej). Dokonywanie przeglądu rezerwatu także poza transektami. Rozpoczęcie monitoringu w pierwszych 3 latach funkcjonowania planu. Częstotliwość - nie rzadziej niż 1 raz/3 lata.  Podjęcie ew. eliminacji wybranych gatunków zgodnie ze wskazaniami monitoringu.	Obszar całego rezerwatu
2.	Monitoring przyrodniczy rzeki Rekowej.	Monitoring rzeki włosienicznikowej zgodnie z metodyką GIOŚ. Odcinek RHS wskazany w dokumentacji PO <sup>1</sup> (2020). Co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu, np. w 5, 10 i 15 roku obowiązywania planu.	Odcinek rzeki Rekowej poniżej mostu na drodze krajowej.
3.	Monitoring roślinności leśnej, nieleśnej i źródłiskowej. Wykonanie zdjęć fitosocjologicznych na co najmniej: – dwóch transektach w płatach żyznej buczyny niżowej <i>Melico-Fagetum</i> ; – trzech transektach/stanowiskach w płatach łągu jesionowo-olszowego <i>Fraxino-Alnetum</i> ; – czterech transektach/stanowiskach w płatach grądu subatlantyckiego <i>Stellario-Carpinetum</i> ; – jednego transektu w płatach	Monitoring zgodnie z metodyką GIOŚ z modyfikacją ekspercką po uzgodnieniu z RDOŚ (dot. leśnych zbiorowisk zastępczych oraz nieleśnych traworośli). Transekty/stanowiska wskazane w dokumentacji PO (2020). Co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu, np. w 5, 10 i 15 roku obowiązywania planu.	Obszar całego rezerwatu.

<sup>1</sup> Dokumentacja do planu ochrony rezerwatu przyrody „Rzeka Rekowa” (PALUDELLA Pracownia Przyrodnicza Katarzyna Kiaszewicz, Poznań – Torzym, październik 2020 r.)

Lp.	Rodzaj działań	Zakres działań	Lokalizacja
	<p>leśnych zbiorowisk zastępczych z potencjalnego kręgu <i>Melico-Fagetum</i>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwóch transektów w płatach leśnych zbiorowisk zastępczych z potencjalnego kręgu <i>Stellario-Carpinetum</i>;</li> <li>- dwóch stanowiskach w płacie zbiorowisk źródliskowych ze związku <i>Caricion remotae</i>;</li> <li>- dwóch stanowiskach we obrębie połęgowych traworośli z klasy <i>Artemisietea</i>;</li> </ul>		
4.	Monitoring stanu populacji wybranych gatunków ichtiofauny: głowacza białopłetwego, minoga strumieniowego, kozy.	Monitoring zgodnie z metodyką GIOŚ. Co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu, np. w 5, 10 i 15 roku obowiązywania planu.	Rzeka Rekowa w rezerwacie.
5.	Monitoring populacji cennych gatunków flory w rezerwacie (dot. m.in.: <i>Actaea spicata</i> , <i>Corydalis intermedia</i> , <i>Batrachium trichophyllum</i> , <i>Hildenbrandia rivularis</i> , <i>Neckera complanata</i> , <i>Homalia trichomanoides</i> , <i>Ortotrichum lyellii</i> , <i>Ulota crispa</i> , <i>Ulota bruchii</i> ). Podejmowanie adekwatnych działań ochrony gatunków wskazanych podczas monitoringu.	Ocena stanu populacji (z założeniem kart monitoringu) dla wybranych najcenniejszych gatunków flory. Zaplanowanie optymalnych metod ochrony i ich realizacja w zależności od potrzeb ochrony wybranych gatunków. Realizacja monitoringu zgodnie z metodyką ekspercką (obligatoryjnie ocena stanu populacji oraz siedliska). Co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu, np. w 5, 10 i 15 roku obowiązywania planu.	Obszar całego rezerwatu.
6.	Monitoring zagrożeń dla celu ochrony przyrody w rezerwacie. Identyfikacja zagrożeń dla celu ochrony przyrody w rezerwacie, w szczególności zagrożeń antropogenicznych i podejmowanie adekwatnych działań zapobiegawczych.	Kontrole obszaru rezerwatu nie rzadziej niż 1/dwa lata.	Obszar całego rezerwatu (w szczególności sąsiedztwo drogi krajowej).
7.	Utrzymanie czystości	Zbiórka śmieci z miejsc ich nagromadzenia oraz wywóz poza obszar rezerwatu – w terminach i z częstotliwością zależną od potrzeb.	Obszar całego rezerwatu.
8.	Oznakowanie rezerwatu	Konserwacja lub wymiana tablic urzędowych i regulaminowych postawionych przy granicy rezerwatu (według potrzeb).	Granice rezerwatu.
9.	Okresowe kontrole rezerwatu pod kątem zagrożenia sanitarnego drzewostanów przyległych do rezerwatu i podejmowanie adekwatnych działań zapobiegawczych.	Ewentualna wycinka i usuwanie z rezerwatu świerków <i>Picea abies</i> opanowanych przez szkodniki owadzie, w stopniu który mógłby zagrozić przyległym drzewostanom gospodarczym. Pozostawianie posuszu jałowego na terenie rezerwatu. Przedmiotowe działania należy podejmować tylko w sytuacjach faktycznego i udokumentowanego	Obszar całego rezerwatu.

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj działań</b>	<b>Zakres działań</b>	<b>Lokalizacja</b>
		zagrożenia, po uzyskaniu akceptacji RDOŚ w Szczecinie.	

Załącznik nr 3 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Opis granicy części obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049 pokrywającej się z rezerwatem w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992<sup>2</sup>

Lp.	X	Y	Uwagi
1	668535,02	255579,79	Część 1*
2	668416,97	255519,45	Część 1
3	668397,28	255509,40	Część 1
4	668387,20	255504,25	Część 1
5	668193,13	255405,11	Część 1
6	668046,94	255330,76	Część 1
7	668033,22	255267,90	Część 1
8	668032,07	255262,68	Część 1
9	668012,34	255217,39	Część 1
10	667987,15	255192,09	Część 1
11	667917,16	255083,85	Część 1
12	667917,96	255056,09	Część 1
13	667885,38	255034,14	Część 1
14	667817,97	254896,98	Część 1
15	667800,24	254873,32	Część 1
16	667757,23	254804,93	Część 1
17	667797,62	254678,25	Część 1
18	667873,54	254645,94	Część 1
19	667887,84	254639,86	Część 1
20	667893,54	254640,02	Część 1
21	667923,38	254637,42	Część 1
22	667943,23	254636,45	Część 1
23	668002,98	254652,13	Część 1
24	667970,63	254811,02	Część 1
25	668019,58	254790,87	Część 1
26	668045,70	254815,45	Część 1
27	668076,52	254834,07	Część 1
28	668112,11	254878,24	Część 1
29	668192,21	254913,40	Część 1
30	668211,69	254927,98	Część 1
31	668255,48	254938,25	Część 1
32	668260,69	254938,13	Część 1
33	668263,37	254938,07	Część 1
34	668262,09	254939,63	Część 1
35	668261,32	254940,58	Część 1
36	668299,55	254972,05	Część 1
37	668346,38	255010,40	Część 1
38	668347,73	255011,50	Część 1


<sup>2</sup> Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 i 1641 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).



39	668350,22	255014,82	Część 1
40	668360,36	255028,34	Część 1
41	668309,34	255091,73	Część 1
42	668316,38	255109,32	Część 1
43	668333,08	255118,11	Część 1
44	668349,57	255133,72	Część 1
45	668359,71	255156,58	Część 1
46	668360,57	255158,52	Część 1
47	668361,66	255160,98	Część 1
48	668361,66	255168,02	Część 1
49	668376,61	255193,73	Część 1
50	668367,15	255221,87	Część 1
51	668371,75	255239,07	Część 1
52	668421,43	255242,96	Część 1
53	668423,04	255243,94	Część 1
54	668447,47	255258,34	Część 1
55	668449,35	255259,46	Część 1
56	668451,27	255260,59	Część 1
57	668451,97	255261,00	Część 1
58	668520,65	255358,21	Część 1
59	668523,10	255361,71	Część 1
60	668516,91	255516,51	Część 1
61	668516,76	255520,19	Część 1
62	668535,02	255579,79	Część 1
63	668870,67	256196,29	Część 2*
64	668712,51	256216,67	Część 2
65	668702,11	256217,89	Część 2
66	668674,02	256221,01	Część 2
67	668661,05	256242,34	Część 2
68	668621,89	256258,64	Część 2
69	668485,80	256267,29	Część 2
70	668485,79	256267,26	Część 2
71	668456,50	256203,41	Część 2
72	668408,26	256098,28	Część 2
73	668406,58	256098,08	Część 2
74	668384,28	256095,47	Część 2
75	668372,97	256090,57	Część 2
76	668313,78	256055,51	Część 2
77	668302,47	256037,04	Część 2
78	668293,80	256021,96	Część 2
79	668295,69	256005,00	Część 2
80	668299,46	255981,62	Część 2
81	668335,65	255921,69	Część 2
82	668297,20	255879,84	Część 2
83	668283,62	255838,75	Część 2
84	668282,94	255833,37	Część 2
85	668284,37	255833,13	Część 2
86	668284,38	255833,04	Część 2
87	668284,67	255830,92	Część 2
88	668288,53	255802,18	Część 2


89	668288,85	255800,10	Część 2
90	668291,54	255782,20	Część 2
91	668322,45	255722,26	Część 2
92	668325,09	255692,86	Część 2
93	668296,82	255664,96	Część 2
94	668290,79	255641,97	Część 2
95	668307,00	255558,66	Część 2
96	668269,30	255557,53	Część 2
97	668267,96	255557,91	Część 2
98	668268,46	255556,34	Część 2
99	668292,63	255479,32	Część 2
100	668373,38	255520,70	Część 2
101	668380,54	255523,95	Część 2
102	668534,53	255601,30	Część 2
103	668534,49	255601,59	Część 2
104	668531,07	255634,62	Część 2
105	668508,26	255649,58	Część 2
106	668446,65	255618,44	Część 2
107	668411,21	255632,24	Część 2
108	668407,95	255676,95	Część 2
109	668395,38	255742,12	Część 2
110	668387,01	255785,53	Część 2
111	668388,85	255809,36	Część 2
112	668389,52	255812,99	Część 2
113	668389,89	255815,00	Część 2
114	668391,11	255821,58	Część 2
115	668426,84	255916,72	Część 2
116	668420,62	255931,13	Część 2
117	668534,96	255936,21	Część 2
118	668588,87	255938,62	Część 2
119	668593,65	255938,85	Część 2
120	668597,31	255939,04	Część 2
121	668613,29	255939,96	Część 2
122	668626,49	255940,81	Część 2
123	668644,51	255941,90	Część 2
124	668683,95	255944,38	Część 2
125	668724,73	255946,94	Część 2
126	668766,57	255949,62	Część 2
127	668842,22	256013,61	Część 2
128	668845,69	256016,56	Część 2
129	668846,32	256017,08	Część 2
130	668866,39	256159,52	Część 2
131	668866,13	256162,77	Część 2
132	668870,67	256196,29	Część 2

\*Części rezerwatu wskazane przy opisie granic.



Załącznik nr 4 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Mapa części obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049 pokrywającej się z rezerwatem.



Załącznik nr 5 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony dla części obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049 pokrywającej się z rezerwatem.

Lp.	Przedmiot ochrony	Zagrożenia		Opis zagrożenia	
		Istniejące	Potencjalne		
1.	3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników ( <i>Ranuncion fluitantis</i> ).	I01 Obce gatunki inwazyjne		Umiarkowanie liczna populacji moczarki kanadyjskiej <i>Elodea canadensis</i> oraz wodożytki nowozelandzkiej <i>Potamopyrgus antipodarum</i> .	
		M01.02 Susze i zmniejszenie opadów		Utrzymujące się niskie stany wód. Zmiany wieloletnie o charakterze globalnym.	
			J02.02 Usuwanie osadów (mułu...) J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych		Nieuzasadnione działania utrzymaniowe oraz inne ingerujące w profil podłużny lub poprzeczny cieku prowadzą do zniszczenia lub znacznego pogorszenia się stanu zachowania siedliska przyrodniczego. Dotyczy także możliwych działań realizowanych na rzece Rekowej powyżej rezerwatu.
			J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód		Wszelkie działania polegające na zaburzeniu naturalnego biegu rzek (wszelkie przegrody, budowle hydrochemiczne, piętrzenia, tamy bobrowe, itp.) i wpływające negatywnie na jej funkcjonowanie prowadzą do zniszczenia lub znacznego pogorszenia się stanu zachowania siedliska przyrodniczego.
			H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe		Zaśmiecanie i zanieczyszczanie wód rzeki prowadzi do degeneracji siedliska przyrodniczego. Dopływy zanieczyszczeń oraz zawiesin pochodzących z drogi krajowej DK 6.
			M01.02 Susze i zmniejszenie opadów		Pogłębiające się zmiany o charakterze globalnym.
			C01 Górnictwo w kopalniach i kamieniołomach		Rezerwat sąsiaduje z dużym obszarem wydobycia piasku co może wpływać na zaburzenia warunków wodnych.
2.	9130 Żyzne buczyny ( <i>Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion</i> )	I01 Obce gatunki inwazyjne		Neofityzacja drzewostanu – na dwóch stanowiskach obserwowano dąb czerwony <i>Quercus rubra</i> , gatunek ten jednak nie odnawia się w rezerwacie; liczny udział niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> .	
		B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew		Gospodarka leśna prowadzona przed utworzeniem rezerwatu przyczyniła się do zubożenia i uproszczenia struktury zbiorowiska leśnego.	
			H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe		Zaśmiecanie związane z nielegalną penetracją.
3.	9160 Grąd subatlantycki ( <i>Stellario-Carpinetum</i> ).	I01 Nierodzone gatunki zaborcze.		Neofityzacja runa – niecierpek pospolity <i>Impatiens parviflora</i> , neofityzacja drzewostanu – świerk pospolity <i>Picea abies</i> .	

		B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew		Gospodarka leśna prowadzona przed utworzeniem rezerwatu przyczyniła się do zubożenia i uproszczenia struktury zbiorowiska leśnego.
			H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe	Zaśmiecanie związane z nielegalną penetracją.
4.	91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe ( <i>Salicetum albo-fragilis</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnenion glutinoso-incanae</i> ) i olsy źródliskowe.	J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska		Dekompozycja fitocenozy z uwagi na obfite występowanie niecierpka drobnokwiatowego <i>Impatiens parviflora</i> . Niewielki udział świerka pospolitego w podrostach.
		I01 Obce gatunki inwazyjne		
		I02 Problematyczne gatunki rodzime.		Ekspansja pokrzywy zwyczajnej <i>Urtica dioica</i> .
		K02.01 Zmiana składu gatunkowego (sukcesja)		Grądowienie związane z przesuszeniem siedlisk.
		M01.02 Susze i zmniejszenie opadów		Zmiany wieloletnie o charakterze globalnym.
		B02.04 Usuwanie martwych i umierających drzew		Gospodarka leśna prowadzona przed utworzeniem rezerwatu przyczyniła się do zubożenia i uproszczenia struktury zbiorowiska leśnego.
			J02.02 Usuwanie osadów (mułu...) J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych	Nieuzasadnione działania utrzymaniowe oraz inne ingerujące w profil podłużny lub poprzeczny cieką prowadzą do pogorszenia się stanu zachowania siedliska przyrodniczego.
			J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód	Wszelkie działania polegające na zaburzeniu naturalnego biegu rzek (wszelkie przegrody, budowle hydrochemiczne, piętrzenia, tamy bobrowe, itp.) i wpływające negatywnie na jej funkcjonowanie prowadzą do zniszczenia lub znacznego pogorszenia się stanu zachowania siedliska przyrodniczego.
			M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Pogłębiające się zmiany o charakterze globalnym.
			H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe	Zaśmiecanie związane z nielegalną penetracją.
5. 6. 7.	1096 minóg strumieniowy <i>Lampetra planeri</i>  1163 głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i>	J02.05.05 Niewielkie projekty hydroenergetyczne		Pozostałości piętrzenia po jazie wpływają negatywnie na migrację ryb i minogów w górę cieką i dotarcie na tarliska.
		M01.02 Susze i zmniejszenie opadów		Utrzymujące się niskie stany wód. Zmiany wieloletnie o charakterze globalnym.

1149 koza <i>Cobitis taenia</i> .		J02.03 Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych. J02.02 Usuwanie osadów (mułu)	Nieuzasadnione działania utrzymaniowe oraz inne ingerujące w profil podłużny lub poprzeczny cieku prowadzą do zniszczenia siedliska lub znacznego pogorszenia się stanu siedlisk oraz populacji gatunków. Dotyczy także możliwych działań realizowanych na rzece Rekowej powyżej rezerwatu.
		J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód	Wszelkie działania polegające na zaburzeniu naturalnego biegu rzek (wszelkie przegrody, budowle hydrochemiczne, piętrzenia, tamy bobrowe, itp.) i wpływające negatywnie na jej funkcjonowanie prowadzą do zniszczenia siedliska lub znacznego pogorszenia się stanu siedlisk oraz populacji gatunków.
		M01.02 Susze i zmniejszenie opadów	Pogłębiające się zmiany o charakterze globalnym.
		H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych H05 Zanieczyszczenie gleby i odpady stałe	Zaśmiecanie i zanieczyszczanie wód rzeki prowadzi do degeneracji siedliska przyrodniczego. Dopływ zanieczyszczeń oraz zawiesiny pochodzących z drogi krajowej DK 6.
		C01 Górnictwo w kopalniach i kamieniołomach	Rezerwat sąsiaduje z dużym obszarem wydobycia piasku co może wpływać na zaburzenia warunków wodnych.

Załącznik nr 6 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Cele działań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049 pokrywającej się z rezerwatem.

Przedmiot ochrony	Wskaźnik	Cel działań ochronnych
3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników ( <i>Ranunculus fluitantis</i> ).	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 1,9 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów.
	Gatunki charakterystyczne - włosieniczniki	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Pokrycie transektu włosienicznikami (za wyjątkiem <i>B. circinatum</i> ) co najmniej na 2 w skali MMOR (FV).
	Gatunki charakterystyczne - inne	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Obecność co najmniej 2 gatunków charakterystycznych/wskaźnikowych (FV). Za gatunki wskaźnikowe uznaje się m.in.: <i>Berula erecta fo. submersa</i> , <i>Veronica beccabunga fo. submersa</i> , <i>Veronica anagallis-aquatica fo. submersa</i> , <i>Callitriche sp.</i> , <i>Potamogeton alpinus</i> , <i>Groenlandia densa</i> , <i>Fontinalis antipyretica</i> , <i>Hildenbrandia rivularis</i> oraz inne gatunki uznane przez eksperta wyróżniające lokalnie postać siedliska.
	Materiał dna koryta	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Co najmniej 20% gruboziarnistego materiału dna (żwir, kamienie), udział frakcji mułowej nie przekracza 20% (FV).
	Ocena stanu ekologicznego	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Co najmniej dobry stan ekologiczny - wartość MIR >35 (FV).
	Pokrycie transektu przez moczarkę kanadyjską	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Pokrycie nie większe niż 2 w skali MMOR (FV).
	Przepływy	Utrzymanie oceny wskaźnika U1. Na transekcje od 10 do 40% pokrycia szybkich typów przepływu - kipieli, rwący, wartki (FV).
	Śpiętrzenie wód rzeki	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Brak znaczących spiętrzeń rzeki (FV).
	Wskaźnik naturalności siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Wartość wskaźnika HQA $\geq 50$ (FV).
	Wskaźnik przekształcenia siedliska	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Wartość wskaźnika HMS $\leq 20$ (FV).
	Naturalne elementy hydrologiczne	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Obecność co najmniej 3 naturalnych elementów morfologicznych (FV). Do naturalnych elementów morfologicznych zalicza się m.in.: odsypy, bystrza, podcięcia brzegów, wyspy, głazy, gruby rumosz drzewny.
	Gatunki inwazyjne	Utrzymanie oceny FV wskaźnika. Brak lub obecność maksymalnie 1-2 gatunków obcych (wyjątek <i>Elodea canadensis</i> ) z których żaden nie jest liczny (FV).
	Ścieki	Utrzymanie oceny FV wskaźnika. Brak dopływu ścieków (FV).
	Zacienienie rzeki	Utrzymanie oceny FV wskaźnika. Maksymalnie 50% stopień zacienienia koryta rzecznoego (FV).
9130 Żyzne buczyny ( <i>Dentario glandulosae-Fagenion</i> , <i>Galio odorati-Fagenion</i> )	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 15,5 ha siedliska.
	Charakterystyczna kombinacja florystyczna	Utrzymanie oceny wskaźnika FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska. Typowa kombinacja florystyczna z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Do gatunków charakterystycznych i



		wyróżniających zaliczono m.in.: <i>Melica uniflora</i> , <i>Galeobdolon luteum</i> , <i>Festuca altissima</i> , <i>Galium odoratum</i> , <i>Carex sylvatica</i> , <i>Millium effusum</i> , <i>Dryopteris filix-mas</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Anemone nemorosa</i> , <i>Viola reichenbachiana</i> . W wariancie wilgotnym ponadto: <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Circaea lutetiana</i> , <i>Carex remota</i> . Drzewostan buduje buk, z ew. domieszką dębu szypułkowego, rzadziej jawora, grabu i brzozy brodawkowatej. Punktowo stwierdzono obecność dębu czerwonego nie odnawiającego się. W warstwie podszytu i podrostu dominuje buk (z naturalnego odnowienia), miejscami także z większą dynamiką jaworu oraz jesionu.
	Skład drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Drzewostan z dominującym udziałem buka > 80% (FV).
	Obce gatunki inwazyjne w podszytcie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika U1. Najwyżej nieliczny udział obcych gatunków inwazyjnych (np. <i>Impatiens parviflora</i> ) w runie (U1).
	Ekspansywne gatunki rodzime w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Występują co najwyżej pojedyncze okazy (np. <i>Rubus sp.</i> , <i>Calamagrostis epigejos</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> ) nie wskazujące na ekspansję (FV).
	Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika U1. Drzewostan mimo wieku uproszczony strukturalnie, dominują drzewa w jednym wieku (U1).
	Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Udział drzew starych > 100 lat >10% (FV).
	Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Naturalne odnowienie obecne, wypełniające luki i odnowienia, w składzie gatunkowym dominuje buk (FV).
	Gatunki obce w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Brak gatunków obcych lub ich udział nie przekraczający 5% pod warunkiem braku młodego pokolenia (FV). Niewielki udział dębu czerwonego, nie odnawiającego się.
	Martwe drewno (łącznie zasoby)	Osiągnięcie oceny wskaźnika U1. Martwe drewno w przedziale 10- 20m <sup>3</sup> /ha (U1).
	Martwe drewno wielkowymiarowe	Osiągnięcie oceny wskaźnika U1. Minimum 3-5szt./ha (U1).
	Mikrosiedliska drzewne	Osiągnięcie oceny wskaźnika U1. Minimum 10-20szt./ha (U1).
	Inne zniekształcenia	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Brak zniekształceń (FV).
9160 Grąd subatlantycki ( <i>Stellario-Carpinetum</i> )	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 9 ha siedliska.
	Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Typowa kombinacja florystyczna z uwzględnieniem specyfiki regionalnej (FV). Do gatunków charakterystycznych i wyróżniających zaliczono m.in.: <i>Galeobdolon luteum</i> , <i>Galium odoratum</i> , <i>Stellaria holostea</i> , <i>Carex sylvatica</i> , <i>Millium effusum</i> , <i>Pulmonaria obscura</i> , <i>Viola reichenbachiana</i> , <i>Ranunculus lanuginosus</i> , <i>Dryopteris filix-mas</i> , <i>Anemone sp.</i> , <i>Hepatica nobilis</i> , <i>Poa nemoralis</i> , <i>Polygonatum multiflorum</i> , <i>Carex sylvatica</i> , <i>Stachys sylvatica</i> , <i>Ranunculus auricomus</i> , <i>Corydalis intermedia</i> , <i>Carex digitata</i> , <i>Brachypodium sylvaticum</i> , <i>Adoxa moschatellina</i> . Dopuszcza się sytuacje słabiej rozwiniętego runa wynikającą z zacinienia dna lasu.
	Gatunki dominujące w poszczególnych warstwach fitocenozy	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. W każdej warstwie zbiorowiska dominują gatunki właściwe dla siedliska (FV). Drzewostan grądów budują występujące w różnych proporcjach: dąb szypułkowy, grab, buk. W domieszce spotyka się ponadto: jawor, brzozę brodawkowatą. W warstwie podszytu i podrostu dominują: leszczyna, jawor,

		grab, buk. W runie dominują gatunki typowo leśne ze stałym udziałem gatunków ze związku <i>Galio-Alliarion</i> .
	Udział graba	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Udział grabu w drzewostanie > 10% (FV).
	Udział w drzewostanie gatunków liściastych (bez wczesno sukcesyjnych)	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Udział gatunków liściastych typowych dla siedliska w regionie na poziomie > 90 %.
	Udział w drzewostanie gatunków wczesnosukcesyjnych	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Gatunki, wczesno sukcesyjne obecne ale na poziomie < 10%.
	Obce gatunki inwazyjne w podszycie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika U1. Obecny jeden gatunek (np. <i>Impatiens parviflora</i> ), lecz nie bardzo liczny i nieekspansywny (U1).
	Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Udział sporadyczny (głównie gatunki zielne nitrofilne oraz jeżyny) – FV.
	Struktura pionowa i przestrzenna roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Struktura zróżnicowana, > 50% pokryte przez zwarty drzewostan, obecne luki i prześwietlenia (ocena FV).
	Wiek drzewostanu (udział starodrzewu)	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Udział drzew starych > 100 lat >10% (FV)
	Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Obfite, z dominującym udziałem graba (FV).
	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	Osiągnięcie oceny wskaźnika FV. Udział gatunków obcych geograficznie (np. <i>Picea abies</i> ) nie odnawiających się < 1% (FV). Obecnie w części płatów udział świerka na poziomie ok. 5%, niemniej gatunek w widocznej regresji (zamieranie oraz szkodniki wtórne).
	Gatunki obce ekologicznie w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Udział gatunków obcych ekologicznie (np. <i>Pinus sylvestris</i> ) < 10% (FV).
	Martwe drewno (łącznie zasoby)	Osiągnięcie oceny wskaźnika U1. Martwe drewno w przedziale 10- 20m <sup>3</sup> /ha (U1).
	Martwe drewno leżące lub stojące wielkowymiarowe >3 m długości i >50cm grubości	Osiągnięcie oceny wskaźnika U1. Minimum 3-5szt./ha (U1).
	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Brak śladów zniszczenia runa (FV).
	Inne zniekształcenia	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Brak zniekształceń (FV).
91E0* łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe ( <i>Salicetum albae</i> , <i>Populetum albae</i> , <i>Alnion glutinoso-incanae</i> , olsy źródłiskowe)	Powierzchnia siedliska	Utrzymanie stabilnej powierzchni co najmniej 2 ha siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów.
	Gatunki charakterystyczne	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Kombinacja florystyczna typowa dla łągów (FV). Do głównych gatunków wskaźnikowych dla różnych postaci 91E0 w obszarze należy zaliczyć: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Circaea lutetiana</i> , <i>Festuca gigantea</i> , <i>Carex remota</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Padus avium</i> , <i>Impatiens nolitangere</i> , <i>Cardamine amara</i> , <i>Chrysosplenium alternifolium</i> , <i>Stellaria nemorum</i> , <i>Athyrium filix-femina</i> , <i>Mercurialis perennis</i> , <i>Valeriana sambucifolia</i> , <i>Plagiomnium undulatum</i> , <i>Brachythecium rivulare</i> .
	Gatunki dominujące	Utrzymanie oceny wskaźnika U1. We wszystkich warstwach dominują gatunki typowe przy czym zaburzone są relacje ilościowe (U1). Drzewostan tworzą: olsza czarna z domieszką jesionu. Podszyt tworzą: czeremcha zwyczajna, leszczyna, trzmielina

		oraz rodzime gatunki porzeczek. Runo zdominowane przez gatunki typowe, w płatach bardziej przesuszonych z większym udziałem pokrzywy i gatunków grądowych. Miejscami subdominacja obcego niecierpka drobnokwiatowego. W płatach o charakterze źródłiskowym stały udział gatunków z klasy <i>Montio-Cardaminetea</i> .
	Naturalność koryta rzeczego	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Ciek o charakterze naturalnym (FV).
	Reżim wodny	Utrzymanie oceny wskaźnika FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska. Przewodnienie podłoża właściwe dla łągów, nie zawsze związane z zalewami rzecznyymi (FV). Cześć płatów nosi ślady przesuszenia. Utrzymanie wskaźnika uzależnione w znacznej mierze od naturalnych procesów.
	Obce gatunki inwazyjne w podszybie i runie	Utrzymanie oceny wskaźnika U1. Obecny 1 gatunek ale stosunkowo liczny (np. <i>Impatiens parviflora</i> ), o pokryciu do 30% (U1). Utrzymanie wskaźnika uzależnione w znacznej mierze od naturalnych procesów.
	Ekspansywne gatunki rodzime (apofity) w runie	Utrzymanie oceny wskaźnika FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska. Występują gatunki niepożądane lecz nieliczne i nie wykazują tendencji do ekspansji (np. <i>Urtica dioica</i> ) – FV. W części płatów subdominacja pokrzywy w runie. Utrzymanie wskaźnika uzależnione w znacznej mierze od naturalnych procesów.
	Pionowa struktura roślinności	Utrzymanie oceny wskaźnika FV w obrębie co najmniej 75% powierzchni siedliska. Struktura naturalna lub znaturalizowana, zróżnicowana, obecne luki, drzewostan wielogeneracyjny.
	Wiek drzewostanu	Osiągnięcie oceny wskaźnika FV. > 20% udział drzew starszych niż 100 lat.
	Naturalne odnowienie drzewostanu	Utrzymanie oceny wskaźnika U1. Odnowienie naturalne występuje, lecz nielicznie (U1).
	Gatunki obce geograficznie w drzewostanie	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Płaty siedliska bez gatunków obcych geograficznie (<1%).
	Martwe drewno (łącznie zasoby)	Osiągnięcie oceny wskaźnika FV. Martwe drewno min 20m <sup>3</sup> /ha.
	Martwe drewno leżące lub stojące wielkowymiarowe >3 m długości i >50cm grubości	Osiągnięcie oceny wskaźnika FV. Minimum 5szt./ha.
	Zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Brak śladów zniszczenia runa.
	Inne zniekształcenia	Utrzymanie oceny wskaźnika FV. Brak zniekształceń (FV).
1163 głowacz białopłetwy <i>Cottus gobio</i>	Populacja	Utrzymanie stanu populacji na poziomie FV. Względna liczebność – FV. Struktura wiekowa – U1. Udział gatunku w zespole ryb i minogów – FV.
	Siedlisko	Utrzymanie stanu siedliska na poziomie co najmniej U1. EFI+ - FV Jakość morfologiczna – FV Stan ekologiczny wody – U1 Mozaika mikrosiedlisk – FV Zarybienia gatunkami zagrażającymi głowaczowi – U1
1096 minóg	Populacja/względna liczebność	Utrzymanie stanu populacji na poziomie FV. Względna liczebność – FV.

strumieniowy <i>Lampetra planeri</i>		Struktura wiekowa – FV. Udział gatunku w zespole ryb i minogów – FV.
	Siedlisko	Utrzymanie stanu siedliska na poziomie FV. EFI+ - FV Jakość morfologiczna – FV Stan ekologiczny wody – U1 Występowanie niezbędnych mikrosiedlisk – FV
1149 koza pospolita <i>Cobitis taenia</i>	Populacja	Utrzymanie stanu populacji na poziomie U1. Względna liczebność – FV. Struktura wiekowa – U1. Udział gatunku w zespole ryb i minogów – FV.
	Siedlisko	Utrzymanie stanu siedliska na poziomie U1. EFI+ - FV Jakość hydromorfologiczna – U1

Załącznik nr 7 do zarządzenia  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Określenie działań ochronnych dla części obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049, pokrywającej się z rezerwatem, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów wdrażania.

Kod przedmiotu ochrony	Działanie ochronne <sup>3</sup>	Obszar wdrażania	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie
3260	Ocena stanu ochrony siedliska co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu , np. w 5 i 10 i 15 roku obowiązywania planu ochrony rezerwatu (zgodnie z metodyką GIOŚ).	Odcinek RHS wskazany w dokumentacji PO (2020) <sup>1)</sup> .	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
9130	Ocena stanu ochrony siedliska co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu , np. w 5 i 10 i 15 roku obowiązywania planu ochrony rezerwatu (zgodnie z metodyką GIOŚ).	Na dwóch transektach wskazanych w dokumentacji PO (2020) o następujących współrzędnych: 1. Początek: N 53°49'05.77'' E 15°16'29.79'', środek: N 53°49'08.77'' E 15°16'33.95'', koniec: N 53°49'13.40'' E 15°16'39.78'' 2. Początek: N 53°49'17.25'' E 15°16'46.96'', środek: N 53°49'20.57'' E 15°16'48.98'', koniec: N 53°49'23.01'' E 15°16'55.13''	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
9160	Ocena stanu ochrony siedliska co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu , np. w 5 i 10 i 15 roku obowiązywania planu ochrony rezerwatu (zgodnie z metodyką GIOŚ).	Na czterech transektach/stanowiskach wskazanych w dokumentacji PO (2020) o następujących współrzędnych: 1. Początek: N 53°49'12.81'' E 15°16'54.07'', środek: N 53°49'15.52'' E 15°16'56.72'', koniec: N 53°49'17.45'' E 15°16'58.88'' 2. Początek: N 53°49'19.86'' E 15°17'04.34'', koniec: N 53°49'22.91'' E 15°17'05.42'' 3. Początek: N 53°49'01.90'' E 15°16'29.71'', środek: N 53°49'00.72'' E 15°16'27.33'', koniec: N 53°49'00.79'' E 15°16'20.95'' 4. N 53°49'02.63'' E 15°16'17.79''	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
91E0	Ocena stanu ochrony siedliska co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu , np. w 5 i 10 i 15 roku obowiązywania planu ochrony rezerwatu (zgodnie z metodyką GIOŚ).	Na trzech transektach/stanowiskach wskazanych w dokumentacji PO (2020) o następujących współrzędnych: 1. N 53°49'02.77'' E 15°16'29.97'' 2. N 53°49'02.50'' E 15°16'21.61'' 3. Początek: N 53°49'25.03'' E 15°17'36.98'', koniec: N 53°49'29.63'' E 15°17'34.13''	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
1096	Ocena stanu ochrony	Rzeka Rekowa w rezerwacie	Sprawujący nadzór

<sup>3</sup> Działania tożsame ze wskazaniami załącznika nr 2 (w zakresie monitoringu siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze PLH320049).

	gatunku co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu , np. w 5 i 10 i 15 roku obowiązywania planu ochrony rezerwatu (zgodnie z metodyką GIOŚ).		nad obszarem Natura 2000
1149	Ocena stanu ochrony gatunku co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu , np. w 5 i 10 i 15 roku obowiązywania planu ochrony rezerwatu (zgodnie z metodyką GIOŚ).	Rzeka Rekowa w rezerwacie	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000
1163	Ocena stanu ochrony gatunku co najmniej 3 krotnie w okresie obowiązywania planu , np. w 5 i 10 i 15 roku obowiązywania planu ochrony rezerwatu (zgodnie z metodyką GIOŚ).	Rzeka Rekowa w rezerwacie	Sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000