



KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH MEDYCYNA PODRÓŻY

szczepienia
info

SZCZEPIONKA PRZECIWIW	WIEK (LATA)
	19 - 49
	50 - 65
	≥ 65

Grypie (IIV)

1 dawka co roku

Błonicy, tężcowi,
krztuścowi (Tdap)

1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym)
3 dawki w schemacie 0,1, 6 miesięcy (osoba wcześniej nieszczepiona)

Odrze (MMR)

2 dawki w odstępie ≥4 tygodni (u osób, które nie chorowały na odrę i nie były szczepione)

Covid-19

Liczba dawek zależna od historii szczepień i aktualnych zaleceń

Wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B

3 dawki (osoby wcześniej nieszczepione)

Pneumokokom
(PCV, pPSV)

1 dawka PCV-13 lub PCV-20

1 dawka PCV-13 + 1 dawka pPSV-23
lub 1 dawka PCV-20

Kleszczowemu zapaleniu
mózgu

3 dawki + dawki przypominające co 3-5 lat (osoby, które nie chorowały i nie były szczepione)

Wirusowemu zapaleniu
wątroby typu A

2 dawki (osoby, które nie chorowały i nie były szczepione)

Meningokokom (MenACWY)

1 dawka

Żółtej gorączce

1 dawka

Durowi brzuszemu

1 dawka (szczepionka inaktywowana) lub 3 dawki (szczepionka żywa)

Cholerze

2 dawki (szczepionka inaktywowana) lub 1 dawka (szczepionka żywa)

Japońskiemu zapaleniu
mózgu

2 dawki

Wściekliczynie

2 lub 3 dawki

szczepienia zalecane dla wszystkich nieudpornionych osób w tym wieku
 szczepienia zalecane pod różnym w zależności od celu podróży

IIV - szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; Tdap - szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; MMR - szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; PCV - skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; pPSV - polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; MenACWY - szczepionka przeciw meningokokom serogrupy A, C, W135, Y

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieudpornionych dorosłych wymieniono w KALENDARZU SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH.