



Znak sprawy: DHR.rs.8208.3.111.2022(2023)

POSTANOWIENIE nr 136/2023

Na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego¹ (dalej jako: k.p.a.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o środkach ochrony roślin² (dalej jako: ustawa o środkach ochrony roślin), **postanawiam** z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w zezwoleniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-54/2023 z dnia 8 marca 2023 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Daltrice produkcji Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii, w następujący sposób:

- 1) **Załącznik nr 2 - OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN** otrzymuje brzmienie określone w niniejszym postanowieniu,
- 2) **Załącznik nr 9 - ZASTOSOWANIA MAŁOOLSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN** otrzymuje brzmienie określone w niniejszym postanowieniu.

¹ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 775 t.j.)

² Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 t.j.)

Załącznik nr 2 – OPIS DZIAŁANIA ORAZ WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne jodosulfuron metylosodowy i mezosulfuron metyloyy zaliczane są do grupy 2 (dawnej grupy B).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera dwie substancje czynne zaliczane do inhibitorów syntazy acetylmleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania wzrostu i rozwoju chwastów.

Środek pobierany jest poprzez liście, w mniejszym stopniu poprzez korzenie chwastów i jest transportowany po całej roślinie.

Widocznymi objawami działania środka są wstrzymanie wzrostu chwastów w ciągu pierwszych kilku dni po zabiegu, pojawienie się nekrotycznych plam i postępujące powolne zamieranie roślin.

Całkowite zamieranie chwastów następuje w 4-6 tygodni po zabiegu.

Najskuteczniej niszczy chwasty roczne intensywnie rosnące, znajdujące się w fazie 2-3 liści.

Skuteczności działania sprzyja ciepła i wilgotna pogoda.

Dawka 0,2 kg/ha

Chwasty wrażliwe	tasznik pospolity
Chwasty średniowrażliwe	gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, przetacznik perski, wiechlina roczna
Chwasty średnioodporne	fiołek polny, przytulia czepna, wyczyniec polny

Dawka 0,3 kg/ha

Chwasty wrażliwe	gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, tasznik pospolity, wiechlina roczna
Chwasty średniowrażliwe	przetacznik perski, przytulia czepna, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne	fiołek polny

Dawka 0,4 kg/ha

Chwasty wrażliwe	gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa,
------------------	--

	tasznik pospolity, wiechlina roczna
Chwasty średniowrażliwe	fiołek polny, przetacznik perski, przytulia czepna, wyczyniec polny

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2–0,4 kg/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.

Termin stosowania: środek stosować wiosną od początku krzewienia od fazy gdy widoczne jest pierwsze rozkrzewienie do fazy gdy drugie kolanko co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 21-32)

Środek należy stosować z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność cieczy roboczej

Daltrice w dawce 0,2 kg/ha + adiuwant z grupy estryfikowanego oleju rzepakowego w zalecanej przez producenta dawce (np. adiuwant Actirob 842EC w dawce 0,4 l/ha)

Daltrice w dawce 0,3 kg/ha + adiuwant z grupy estryfikowanego oleju rzepakowego w zalecanej przez producenta dawce (np. adiuwant Actirob 842EC w dawce 0,6 l/ha)

Daltrice w dawce 0,4 kg/ha + adiuwant z grupy estryfikowanego oleju rzepakowego w zalecanej przez producenta dawce (np. adiuwant Actirob 842EC w dawce 0,8 l/ha)

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Załącznik nr 9 - ZASTOSOWANIA MAŁOBSZAROWE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Środek zastosowany w uprawach małoobszarowych może zwalczać również inne gatunki chwastów niż wskazane w punkcie etykiety **Działanie na chwasty**, nie mniej nie zostało to jednoznacznie potwierdzone badaniami. Tym samym w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany w uprawach małoobszarowych środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia.

Pszenica ozima durum, pszenica ozima orkisz

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2–0,4 kg/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia i na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju.

Termin stosowania: środek stosować wiosną od początku krzewienia od fazy gdy widoczne jest pierwsze rozkrzewienie do fazy gdy drugie kolanko co najmniej 2 cm nad pierwszym kolankiem (BBCH 21-32)

Środek należy stosować z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność cieczy użytkowej

Daltrice w dawce 0,2 kg/ha + adiuwant z grupy estryfikowanego oleju rzepakowego w zalecanej przez producenta dawce (np. adiuwant Actirob 842EC w dawce 0,4 l/ha)

Daltrice w dawce 0,3 kg/ha + adiuwant z grupy estryfikowanego oleju rzepakowego w zalecanej przez producenta dawce (np. adiuwant Actirob 842EC w dawce 0,6 l/ha)

Daltrice w dawce 0,4 kg/ha + adiuwant z grupy estryfikowanego oleju rzepakowego w zalecanej przez producenta dawce (np. adiuwant Actirob 842EC w dawce 0,8 l/ha)

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uzasadnienie

W załącznikach nr 2 i nr 9 do zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R-54/2023 z dnia 8 marca 2023 r. na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin Dlatrice, popełniono omyłkę w nazwie środka ochrony roślin stosowanego łącznie z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność cieczy roboczej. Zamiast prawidłowej nazwy środka ochrony roślin Daltrice podano niewłaściwie Zeppos.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia prostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki pisarskie w wydanych przez ten organ decyzjach. W związku z powyższym, postanowiono o sprostowaniu powyższej omyłki.

Na podstawie art. 113 § 3, w związku z art. 144 i art. 127 § 3 k.p.a., strona niezadowolona z niniejszego postanowienia może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi wynosi 200 zł.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Flaszka
zastępca dyrektora
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

(za zwrotnym dowodem doręczenia - ePUAP)

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(wo@piorin.gov.pl)

Instytut Ochrony Roślin – PIB
(decyzje.sor@iorpib.poznan.pl)

Instytut Ogrodnictwa
(ochrona.roslin@inhort.pl)