


# Krztusiec


**OSTRA ZAKAŻNA CHOROBA  
UKŁADU ODDECHOWEGO**




Bakteryjna choroba zakaźna  
przenoszona drogą kropelkową  
wywołana przez pałeczki krztuśca  
***Bordetella pertussis***.

## „Wyjątkowo wysoka zaraźliwość”

**Około 80 % osób**  
nieuodpornionych zarazi się  
po kontakcie z osobą chorą.



W 2020 roku około  
20% chorych na krztusiec  
wymagało **hospitalizacji**.



**Roczna liczba  
przypadków  
na świecie**



**Roczna liczba  
zgonów na  
świecie**



**Roczna liczba  
powikłań neu-  
rologicznych  
na świecie**



Charakterystycznym objawem  
krztuśca jest męczący, suchy  
kaszel utrzymujący się do kilku  
miesięcy tzw. „**studniowy  
kaszel**”.

Innymi objawami są: zapalenie  
gardła, gorączka, katar.

**W Polsce  
na krztusiec rocznie choruje  
od 5 000 do 7 000 osób.**

Jak zapobiegać?

# SZCZEPIENIE PRZYPOMI- NAJĄCE PRZECIWIW KRZTUŚCOWI

Utrzymywanie się przeciwciał w miarę upływu lat maleje, dlatego konieczne jest stosowanie **dawek przypominających** szczepienia! Szczepienia przeciw krztuścowi są **bezpłatne dla dzieci**.



**W programie szczepień ochronnych zakłada się podanie obowiązkowo przypominających dawek szczepionki przeciw krztuścowi dzieciom w 6 roku życia oraz młodzieży w wieku 14 lat.**

**Dawka przypominająca** szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi DTAP (z obniżoną zawartością antygenów błonicy i krztuśca) podawana raz na 10 lat zalecana jest dla:

- młodzieży w wieku **14 lub 19 lat**,
- personelowi medycznemu oddziałów neonatologicznych i pediatrycznych,
- osobom mającym kontakt z niemowlętami,
- kobietom w ciąży.

Dlaczego

## NALEŻY SIĘ SZCZEPIĆ

### Powikłania:

- niedotlenienie,
- sinica,
- bezdech,
- omdlenia,
- wymioty,
- krwawienia ze spojówek, z nosa i uszu,
- pęknięcie naczyń krwionośnych w gałce ocznej i na twarzy,
- obrzęk twarzy.

### Śmiertelne powikłania:

- uszkodzenie mózgu,
- zapalenie płuc.