

REGON, nazwa i adres
 świadczeniodawcy prowadzącego punkt
 szczepień
 (wydruk lub pieczęć)

**ZAPOTRZEBOWANIE NA SZCZEPIONKI
 Z POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-
 EPIDEMIOLOGICZNEJ**

| | | Wypełnia świadczeniodawca | |
|---|--|------------------------------|---|
| Lp. | Szczepionka/nazwa choroby | Ilość zamawianej szczepionki | UWAGI |
| 1. | BCG - gruźlica (ampułka/fiolka zawiera 10-dawek) | | |
| 2. | MMR - odra, świnka i różyczka | | |
| 3. | VZV - ospa wietrzna | | |
| 4. | ROTA - rotawirusy | | |
| 5. | HBV - wirusowe zapalenie wątroby typu B – dzieci (0,5 ml) | | |
| 6. | HBV - wirusowe zapalenie wątroby typu B dla dorosłych (1,0 ml) | | |
| 7. | HBV - wirusowe zapalenie wątroby typu B – dializowani (1,0 ml) | | |
| 8. | PCV-10 - Streptococcus pneumoniae (Synflorix) | | |
| 9. | PCV-13 - Streptococcus pneumoniae (Prevenar-13) ¹ dla wskazanych grup | | |
| 9a. | PCV-13 - Streptococcus pneumoniae (Prevenar-13) - dla populacji ogólnej * | | <i>dla populacji ogólnej</i> (3. dawka szczepienia) <i>wydawany wyłącznie na dokończenie cykli</i> <i>rozpoczętych szczepionką pobraną z PSSE</i> |
| 10. | IPV – poliomyelitis (inaktywowana) | | |
| 11. | HiB - Haemophilus influenzae typ B | | |
| 12. | DTwP - błonica, tężec, krztusiec (pełnokomórkowa) | | |
| 13. | DTaP-HiB-IPV (5-w-1) ^{2,3} Pentaxim | | |
| 13a. | DTaP-HiB-IPV (5-w-1) ^{2,3} Infanrix-IPV-HiB | | <i>wydawany wyłącznie</i> <i>na dokończenie cykli</i> |
| 14. | DTaP-IPV (4-w-1) błonica, tężec, krztusiec, poliomyelitis | | |
| 15. | Tdap - błonica, tężec, krztusiec | | |
| 16. | Td - błonica, tężec | | |
| 17. | T - tężec | | |
| 18. | p/wściekliznie | | |
| | <i>dodać pozycje w razie potrzeby</i> | | |
| Zapotrzebowanie na szczepionki z rezerwy szczepionek i produktów immunologicznych: | | | |
| | | | |
| | | | |
| | <i>dodać pozycje w razie potrzeby</i> | | |

*Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do odbioru szczepionek*

*Pieczęć zapotrzebowującego
(kierującego placówką lub punktem szczepień)*

INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW:

1) Szczepionka przeciw *Streptococcus pneumoniae* typu PCV-10 (Synflorix) jest zakupywana na potrzeby szczepień kalendarzowych w populacji ogólnej oraz szczepień wyrównawczych do 5 r.ż. Stosowanie szczepionki PCV-13 (Prevenar 13) obejmuje:

- a) wcześniaków urodzonych przed ukończeniem 27 tygodnia ciąży,
- b) osób do 19 r.ż. – które nie były wcześniej szczepione przeciw inwazyjnym zakażeniom *Streptococcus pneumoniae* – po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającą z wyciekami płynu mózgowo-rdzeniowego; przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego; przed lub po leczeniu immunosupresyjnym lub biologicznym; z wrodzonymi lub nabytymi niedoborami odporności; z nowotworami, małopłytkowością idiopatyczną; sferocytozą z wrodzoną; z wrodzonymi wadami serca i przewlekłymi chorobami serca; z przewlekłą niewydolnością nerek lub zespołem nerczycowym; z chorobami metabolicznymi, w tym cukrzycą; z przewlekłymi chorobami płuc, w tym astmą.
- c) osób – bez względu na wiek – przed lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, narządów wewnętrznych, splenektomii, albo z asplenią, z zaburzeniami czynności śledziony.

* Na potrzeby zakończenia szczepień rozpoczętych od grudnia 2022 r seriami preparatów PREVENAR-13 zakupionym przez Ministra Zdrowia na potrzeby szczepień populacji ogólnej PSSE będą wydawaty 3 dawkę szczepionki PREVENAR-13. Dokończenie przedmiotowych szczepień (podanie 3. dawki) przypada na 11-13 miesięcy od podania pierwszej dawki (tzn. od października 2023 r.)

2) Szczepionka DTaP-HiB-IPV (5-w-1) jest wydawana ze stacji sanitarno-epidemiologicznych na potrzeby szczepienia dzieci z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową (DTwP) oraz dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

3) Szczepionka Infanrix-IPV-HiB jest obecnie (od dnia 11.08.2023 r. do dowołania) wydawana ze stacji sanitarno-epidemiologicznych wyłącznie na potrzeby dokończenia cykli szczepień już rozpoczętych tą szczepionką (na potrzeby podania 2, 3 lub 4 dawki). Dla dzieci wymienionych w pkt. 2, dla których jeszcze nie rozpoczęto szczepień szczepionką 5-w-1 wydaje się szczepionkę Pentaxim (rozpoczęcie nowych cykli szczepień od 1 dawki).

Zapotrzebowania na szczepionki do prowadzenia szczepień zalecanych przeciw HPV jest składane na odrębnym formularzu zapotrzebowania.

Wzór formularza *Zapotrzebowania na szczepionki* oraz załączona *Informacja dla świadczeniodawców* zostały opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny wg stanu prawnego (Program Szczepień Ochronnych) oraz faktycznego (dostępność szczepionek w stacjach sanitarno-epidemiologicznych)