

BOROWIK SZATAŃSKI

GRZYB TRUJĄCY!!!

WYSTĘPOWANIE

Okazy borowika szatańskiego są rzadkie i gatunek ten uznawany za wymierający. Owocniki tworzą się od lipca do września. Grzyb ten rośnie przeważnie w grupach, w miejscach nasłonecznionych, pod bukami, dębami na podłożu wapiennym.

ZATRUCIE

Powoduje trwające kilka dni zaburzenia żołądkowe, zaburzenia widzenia, spadek ciśnienia, rumień na twarzy.

WYGLĄD

Kapelusz w młodych okazach półkulisty do wypukłego, później często powyginany i spłaszczony. Początkowo kapelusz w kolorze szarawym, następnie zmienia odcień od szarozółtego do skórzastoochrowego.

Rurki żółte, o porach pomarańczowych do karminowych, pod wpływem dotyku stają się niebieskie.

Trzon często jest szerszy niż dłuższy, w górnej części w kolorze żółtym, w dolnej części z odcieniem czerwonym. Miąższ żółtobiały, na przekroju pomалу błękitniejący.

W POLSCE BOROWIK SZATAŃSKI PODLEGA CAŁKOWITEJ OCHRONIE GATUNKOWEJ, W ZWIĄZKU Z CZYM, NIE WOLNO NISZCZYĆ JEGO STANOWISK ANI ZBIERAĆ!

