

Posiadacz zezwolenia:

frunol delicia GmbH, Hansastrasse 74b, D-59425 Unna, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 (0) 2303 / 25 360-0, fax: +49 (0) 2303 / 25 360-50, info@frunol-delicia.de, www.frunol-delicia.de


RATRON GW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
fosforek cynku – 25 g/kg (2,5%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 28/2021 z dnia 5.03.2021 r.

Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem ze środkiem.

	
Uwaga	
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 032	W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
EUH 401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P264	Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280	Stosować rękawice ochronne.
P301+P312 + P330	PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Wypłukać usta. Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Środek gryzoniobójczy o działaniu żołądkowym w formie przynęty gotowej do użycia (RB) w postaci granul. Przeznaczony do zwalczania gryzoni nornikowatych w uprawach roślin.

Po spożyciu środka, w żołądku gryzonia pod wpływem kwasu żołądkowego fosforek cynku ulega rozkładowi tworząc fosfinę (fosforowodór). Fosfina jest bardzo silną trującą metaboliczną i nerwową.

STOSOWANIE ŚRODKA

Uprawy rolnicze

nornik polny, nornik bury

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rośliny sadownicze (w uprawie polowej i w uprawie pod osłonami)

nornik polny, nornik bury, nornica ruda

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Winorośl

nornik polny, nornik bury

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rośliny warzywne (w uprawie polowej i w uprawie pod osłonami)

nornik polny, nornik bury

Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rośliny ozdobne (w uprawie polowej i w uprawie pod osłonami)

nornik polny, nornik bury.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Użytki zielone

nornik polny, nornik bury.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Tereny leśne

nornik polny, nornik bury, nornica ruda

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha
Termin i sposób stosowania: w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie) należy umieścić po 5 granul środka do każdej nory.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Skuteczność środka została dostatecznie potwierdzona wyłącznie w uprawach rolniczych i na użytkach zielonych.

1. Dopuszczone jest stosowanie środka w dawkach dzielonych, dopóki przynęta jest spożywana (suma dawek dzielonych nie może przekroczyć zalecanej maksymalnej dawki dla jednorazowego zastosowania).
2. Przed umieszczeniem środka w norze upewnić się, że jest ona zamieszkała przez gryzonie.
3. Środek jest toksyczny dla zwierząt. Należy stosować go, tak aby nie był on dostępny dla ptaków i innych zwierząt.
4. Nie rozsypywać środka na powierzchni gleby.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na środek i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną (kombinezon), zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.

Po wykonanym zabiegu umieścić w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze o brzmieniu „Zakaz wstępu osobom postronnym na teren poddany zabiegom środkami ochrony roślin – ryzyko zatrucia.”

Martwe gryzonie usuwać natychmiast, w celu uniknięcia wtórnego zatrucia.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić i nie wprowadzać zwierząt na obszar poddany zabiegowi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony zwierząt niebędących celem działania środka przynętę należy umieszczać głęboko w norach (np. przy pomocy pistoletów do aplikacji przynęt). Zabrania się aplikacji środka polegającej na rozrzucaniu lub rozsypywaniu przynęt na ochranianym terenie.

W celu ograniczenia spływu wód opadowych zanieczyszczonych środkiem do wód powierzchniowych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenu stosowania środka do zbiorników i cieków wodnych (nie dotyczy zastosowań w pomieszczeniach zamkniętych).

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem ze środkiem.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Po kontakcie ze skórą, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. Wypłukać usta.

Okres ważności: 2 lata

Data produkcji:

Zawartość netto:

Nr partii: