


# ZAKAŻENIE HIV NIE PRZEKREŚLA TWOJEGO ŻYCIA

Jeśli jesteś pod stałą opieką specjalistów  
i przyjmujesz leki antyretrowirusowe (ARV)  
zgodnie ze wskazaniami medycznymi,  
nie zakażasz innych,  
możesz normalnie pracować,  
założyć rodzinę  
i cieszyć się życiem.

Dowiedz się więcej na:

[aids.gov.pl](http://aids.gov.pl)



**MZ**  
Ministerstwo Zdrowia

Krajowe Centrum  
ds.  
**AIDS**  
Agenda Ministra Zdrowia

# PEP – PROFILAKTYKA FARMAKOLOGICZNA PO NARAŻENIU NA ZAKAŻENIE HIV

W razie zakłucia igłą niewiadomego pochodzenia,  
gwałtu lub innego zdarzenia,  
które mogło narazić Cię na zakażenie HIV,  
jak najszybciej skontaktuj się  
z lekarzem chorób zakaźnych.

PEP jest najbardziej skuteczny w ciągu 48 h od zdarzenia.


Dowiedz się więcej na:

[aids.gov.pl](http://aids.gov.pl)



# PrEP - PROFILAKTYKA FARMAKOLOGICZNA PRZED NARAŻENIEM NA ZAKAŻENIE HIV

To stosowanie leków antyretrowirusowych (ARV)  
u osób niezakażonych,  
w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia HIV  
drogą kontaktów seksualnych.



# PROFILAKTYKA WERTYKALNA – ZAPOBIEGANIE HIV U DZIECI MATEK ZAKAŻONYCH HIV

Wykrycie HIV i włączenie u matki leczenia antyretrowirusowego (ARV) sprawia, że ryzyko zakażenia dziecka jest bliskie zeru.

Dowiedz się więcej na:

[aids.gov.pl](http://aids.gov.pl) 



Ministerstwo Zdrowia



Agenda Ministra Zdrowia

