

Szczepionka przeciwi	24h*	6 tygodni	2 miesiąc	3 miesiąc	4 miesiąc	5 miesiąc	6 miesiąc	7 miesiąc	13-15 miesiąc	16-18 miesiąc	6 lat	12-13 lat	14 lat	19 lat
Gruźlica	BCG													
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B	HBV		HBV					HBV						
Rotawirusom							RV							
Błonica, tężcowa, krztuscowi		DTP	BCG	BCG	BCG	BCG			DTP	DTaP			Tdap	Td
Poliomyelitis			IPV	IPV	IPV	IPV			IPV	IPV				
Hib		Hib	Hib	Hib	Hib	Hib			Hib					
Pneumokokom		PCV			PCV				PCV					
Odrze, śwince, różyczce									MMR		PCV			
Grypie														
Meningokokom														
Ludzkiemu wirusowi brodawczaka													HPV	
Ospie wietrznej													VZV	
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A													HAV	
Kleszczowemu zapaleniu mózgu													KZM	
*szczepienie powinno być przeprowadzone przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego, ** Td obowiązkowe lub Tdap zalecane														

IIV (po ukończeniu 6 m.z.) lub LAIV (po ukończeniu 24 m.z. do ukończenia 18 lat)

MenB i MenACWY lub MenC

szczeni obowiązkowe

szczeni zalecane



