

Posiadacz zezwolenia:

Agrauxine S.A., 7 Avenue du Grand Perigne, 49070 Beaucouzé, Republika Francuska, tel. +33 (0)
241778077, e-mail: contact-agx@agrauxine.lesaffre.com.

ROMEEO

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

cerewisan (substancja z grupy fungicydów pochodzenia mikrobiologicznego) - 941 g/kg (94,1 %)

Zezwolenie MRiRW nr R- 182/2019 z dnia 18.11.2019 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 384 /2020d z dnia 23.06.2020 r.

EUH 401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
---------	---

OPIS DZIAŁANIA

Środek mikrobiologiczny, stymulator reakcji odpornościowych roślin, w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Ogórek, korniszon, cukinia oraz inne dyniowate z jadalną skórką (w uprawie pod osłonami)

mączniak prawdziwy dyniowatych

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/100 m²

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy rozwiniętego 2. liścia na pędzie głównym do pełnej dojrzałości (BBCH 12 – 89).

Zalecana ilość wody: 1-10 l/100 m²

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8

Salata głowiasta i inne gatunki sałat (w uprawie pod osłonami)

mączniak rzekomy sałaty

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 g/100 m²

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy 2. liścia do fazy, gdy główki osiągną typową wielkość kształt i twardość lub osiągnięta została typowa masa liści (BBCH 12 – 49).

Zalecana ilość wody: 1-10 l/100 m²

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8

Truskawka (w uprawie pod osłonami)

szara pleśń

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 g/100 m²
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy rozwiniętego 2. liścia do fazy drugiego zbioru (BBCH 12 – 89).
Zalecana ilość wody: 1-10 l/100 m²
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8

Pomidor, bakłażan (w uprawie pod osłonami)

szara pleśń

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/100 m²
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy rozwiniętego 2. liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości, owoce mają typową barwę (BBCH 12 – 89).
Zalecana ilość wody: 1-10 l/100 m²
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Winorośl (w uprawie polowej)

mączniak rzekomy winorośli, mączniak prawdziwy winorośli, szara pleśń.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 g/100 m²
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy dwóch rozwiniętych liści do fazy dojrzałości jagód do zbioru (BBCH 12 – 89).
Zalecana ilość wody: 1-10 l/100 m²
Odstęp między zabiegami: 7 -10 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10

Melon, arbuz, dynia oraz inne dyniowate z niejadalną skórką (w uprawie polowej)

mączniak prawdziwy dyniowatych

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/100 m²
Termin stosowania środka: Środek stosować zapobiegawczo, od fazy rozwiniętego 2. liścia na pędzie głównym do pełnej dojrzałości (BBCH 12 – 89).
Zalecana ilość wody: 1-10 l/100 m²
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

1. Zabieg najlepiej przeprowadzać wcześniej rano. Unikać opryskiwania w wysokiej temperaturze. W przypadku wystąpienia ulewnego deszczu po zastosowaniu (zachodzi ryzyko splukania) zaleca się ponownie wykonać zabieg.
2. Zabieg wykonać dostateczną ilością cieczy użytkowej, aby całkowicie pokryć powierzchnię roślin.
3. Wskazane jest również, aby cieczą użytkową pokryć górną i dolną stronę liści.
4. W przypadku rozprzestrzeniania się choroby lub wysokiej presji ze strony sprawcy choroby środek zaleca się stosować łącznie lub na przemian ze środkami grzybobójczymi.
5. Stosować środki ochrony osobistej oraz rękawice. Nie ma żadnych pozostałości, w związku z czym nie są zdefiniowane maksymalne poziomy pozostałości.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlewniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

- jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Nie wdychać pyłu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia obszaru poddanego działaniu środka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchym i dobrze wentylowanym miejscu,

- w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, wysoką temperaturą, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgoci

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -