

JAK PRAWIDŁOWO POBRAĆ WYMAZ OKOŁODBYTOWY DO BADAŃ W KIERUNKU PASOŻYTÓW JELITOWYCH?

1

Wskazane jest wykonanie trzykrotnego wymazu okołodbytowego w odstępach 2-3 dni.



2

Kopertę ze szkiełkiem wymazowym podpisać imieniem i nazwiskiem osoby badanej.

Nie podpisywać szkiełka ani przylepca, TYLKO KOPERTE!

3

Wymaz okołodbytowy zawsze powinien być pobierany RANO, najlepiej po przebudzeniu, przed załatwieniem potrzeb fizjologicznych oraz przed myciem/podmywaniem.

- Wyjąć szkiełko podstawowe z naklejonym przylepcom. Odkleić przylepiec od szkiełka podstawowego, ale nie do końca.
- Rozchylić pośladki tak, aby uzyskać dostęp do odbytu. Trzymając jedną ręką szkiełko, klejącą stronę przylepca przykleić jak najgłębiej w okolicę otworu odbytowego, ale nie wkładać do odbytu!
- Przylepiec, równomiernie rozprostowując, nakleić z powrotem na szkiełko (unikając sklejanego przylepca).

4

Wymaz należy dostarczyć do laboratorium najlepiej tego samego dnia. Jeżeli nie jest to możliwe, wymaz należy przechowywać w temperaturze 18-25° C. Czas dostarczenia próbki do badania nie powinien przekroczyć 24 godzin od pobrania.

5

Po pobraniu wymazu okołodbytowego należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.

