

Test na HIV

Gdzie znajduje się Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny (PKD) w województwie łódzkim?



ul. Piotrkowska 5, 90-406 Łódź
1 piętro (Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów)



E-mail: pkd.lodz@gmail.com



Telefon: 504 834 834, 737 443 873

Godziny otwarcia:



Poniedziałki: 16.00–19.00
Środy: 16.00–19.00



Źródło: Fundacja Edukacji Zdrowotnej Lepsze Jutro

Test na HIV

Co warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o zrobieniu go?

Gdzie najlepiej zrobić test?

Najlepszym miejscem do zrobienia testu są
Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne (PKD)



bez skierowania
bezpłatnie
anonimowo



możliwość konsultacji
obecność certyfikowanych doradców

Źródło: aids.gov.pl

Test na HIV

Co warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o zrobieniu go?

Jak odbiera się wynik testu w PKD?

✓ wyłącznie osobiście

nie udziela się informacji o wynikach telefonicznie
ani korespondencyjnie ✓

✓ odbieranie wyniku jest okazją do wyjaśnienia wątpliwości
upewnienia się co do znaczenia wyniku

nie pokazuje się dowodu osobistego ✓

✓ badanie wykonuje się na hasło

Źródło: aids.gov.pl

Test na HIV

Co warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o zrobieniu go?

Jak długo czeka się na wynik testu?



jeden do kilku dni







jeżeli wynik testu przesiewowego okaże się dodatni, wówczas konieczne będzie wysłanie krwi do laboratorium wykonującego testy **potwierdzające zakażenie**, to znaczy testy Western blot, co może się wiązać z dłuższym oczekiwaniem na wynik

Źródło: aids.gov.pl

Test na HIV

Co warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o zrobieniu go?

Co oznacza dodatni (pozytywny) wynik testu?



-  nie jest wynikiem ostatecznym
-  dość często zdarzają się wyniki **fałszywie dodatnie**
-  musi zostać **potwierdzony** przy pomocy testu Western blot
-  dopiero dodatni wynik testu Western blot upoważnia do stwierdzenia, że pacjent jest zakażony HIV

Źródło: aids.gov.pl

Test na HIV

Co warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o zrobieniu go?

Co oznacza wynik ujemny (negatywny) testu?

-  w badanej krwi **nie znaleziono przeciwciał** przeciwko wirusowi HIV
-  jeśli przez **3 miesiące** poprzedzające wykonanie testu nie było żadnych **sytuacji**, które mogłyby doprowadzić do zakażenia HIV, wynik ujemny oznacza, że badany pacjent obecnie **nie jest zakażony HIV**

Źródło: aids.gov.pl

Test na HIV

Pytania, które warto sobie zadać przed podjęciem decyzji o wykonaniu testu w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV:

Czy chcę zrobić test z własnej woli?

Czy dostępne jest poradnictwo przed wykonaniem testu i po nim?



Czy jeśli wynik testu będzie dodatni, możliwe będzie wykonanie testu potwierdzenia?

Czy jest zagwarantowana anonimowość testu?

Jeśli Twoje odpowiedzi to **TAK** – zrób test, jeśli **NIE** – nie rób testu

Źródło: aids.gov.pl

Test na HIV

Co warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o zrobieniu go?

Jak wykonywany jest test na HIV?

 wykonanie testu wymaga pobrania niewielkiej próbki krwi, na ogół nakłuwa się żyłę w zgięciu łokciowym

 **nie trzeba** być przed tym na czczo






w Polsce do pobierania krwi używa się zawsze sterylnych, jednorazowych igieł i strzykawek

Źródło: aids.gov.pl

Test na HIV

Co warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o zrobieniu go?

Co to jest test na HIV?

-  **nie wykrywa** samego wirusa HIV, nie wykrywa też AIDS
-  wykrywa **przeciwciała** skierowane przeciwko wirusowi, produkowane przez układ odpornościowy człowieka zakażonego HIV
-  wyprodukowanie przeciwciał w takiej ilości, by mogły być zauważone przez test wymaga czasu (ten czas nazywany jest **okienkiem serologicznym**). Dlatego od momentu, w którym mogło dojść do zakażenia do zrobienia testu powinny minąć **3 miesiące**.

Źródło: aids.gov.pl

Test na HIV

Powinien zrobić każdy, kto:

kiedykolwiek miał kontakt seksualny z:

- mało znaną osobą/osobami,
- osobą zakażoną HIV,
- partnerami/partnerkami mającymi wielu partnerów seksualnych

■ Test powinny wykonać kobiety w ciąży oraz ich partnerzy

- miał **wielu** partnerów/partnerek seksualnych
- podczas kontaktów seksualnych nie stosował **prezerwatyw**
- przebył jakąś z **chorób** przenoszonych drogą płciową
- kiedykolwiek miał kontakty z osobą przyjmującą narkotyki w **iniekcjach**
- przyjmował narkotyki w iniekcjach i używał niesterylnych igieł i strzykawek, z których korzystały **inne osoby**
- wykonywał np. **tatuaż** lub założenie **kolczyków** przy użyciu niedostatecznie wysterylizowanego sprzętu
- stracił kiedykolwiek **kontrolę** nad swoim zachowaniem (pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków zmieniających świadomość)

