




























# Program Szczepień Ochronnych **obowiązujący od 01.01.2021**

## SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU

Rocznik urodzenia		Gruźlica	Rotawirusy <sup>1</sup>	WZW typu B*	Błonica, tężec, krztusiec	HIB**	IPV***	Pneumokoki	Odra, świnka, różyczka
2021	1 doba (przed wypisem z oddziału)								
	2 miesiąc życia (po ukończeniu 6 tyg.)								
	4 miesiąc życia (po ukończeniu 14 tyg.)								
	5-6 miesiąc życia (8 tyg. po poprzednim szczepieniu)								
	7 miesiąc życia								
2020	13 -15 miesiąc życia								
	16-18 miesiąc życia								
2016 (po ukończeniu 5 r.ż.)									
2012 (po ukończeniu 9 r.ż.)		Szczepienie przypominające dla dzieci, które nie otrzymały tej dawki po ukończeniu 5 r.ż.							
2008 (po ukończeniu 13 r.ż.)									
2003 (po ukończeniu 18 r.ż.) <sup>2</sup>									

<sup>1</sup> Zaleca się zakończenie pełnego schematu szczepień przed ukończeniem 22 tyg. życia

<sup>2</sup> Można stosować szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi ze zmniejszoną zawartością toksoidu błonniczego i komponentu krztuścowego (Tdap)

\* WZW typu B oznacza wirusowe zapalenie wątroby typu B

\*\* Hib oznacza inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b

\*\*\* IPV oznacza poliomyelitis tj. ostre nagminne porażenie dziecięce