



Grzyby trujące!

Grupa I

Objawy zatrucia dopiero po 8- 40 godzinach

Substancja trująca: phalloidyna i amenityna



Muchomor sromotnikowy

Objawy chorobowe i przebieg zatrucia

- Bóle brzucha
- Uporczywe wymioty i biegunka z odwodnieniem ustroju
- Silne pragnienie
- Kurcze mięśni
- Zaburzenie w pracy serca i układu krążenia
- Potem w stanie chorego następuje przemijająca, często złudna poprawa i załamanie czynności wątroby.

UWAGA ZAGROŻENIE ŻYCIA!!



Muchomor jadowity

Grupa II

Objawy zatrucia dopiero po

20-12 godzinach

Substancje trujące gyromitryna



Pierzchnica kasztanowata

Objawy chorobowe i przebieg zatrucia

- Bóle w nadbrzuszu
- Wymioty
- Parcie na stolec, niekiedy biegunka z zubożeniem tkanek w wodę i pragnieniem
- Potem w stanie chorego następuje złudna poprawa, a następnie- bóle wątroby z żółtaczką i czerwono-brunatnym moczem
- Duży niepokój i utrata przytomności

UWAGA ZAGROŻENIE ŻYCIA!!

GRUPA III

Objawy zatrucia po 20 minutach do 2 godzin

Substancje trujące: muskaryna



Muchomor czerwony

Objawy chorobowe i przebieg zatrucia

- Silne rozszerzenie źrenic
- Stany podniecenia i zamroczenia aż do utraty świadomości i śpiączki
- Drgania mięśni
- Niekiedy dolegliwości żołądkowo - jelitowe

UWAGA MOŻLIWOŚĆ ZAGROŻENIE ŻYCIA!!



Muchomor plamisty

GRUPA IV

Objawy zatrucia po 15 minutach do 2 godzin

Substancje trujące: muskaryna



Strzępiak ceglasty

Objawy chorobowe i przebieg zatrucia

- Zwężenie źrenic i zaburzenie widzenia
- Napadowe poty
- Czasem wymioty i biegunka
- Zwolnienie tętna i spadek ciśnienia tętniczego krwi
- Atak duszności
- Drgawki kończyn
- Możliwość zaburzenia świadomości

UWAGA MOŻLIWOŚĆ ZAGROŻENIE ŻYCIA!!

GRUPA V

Objawy zatrucia po 20 minutach do 2 godzin

Substancja trująca bliżej niepoznana



Pieczarka płaska (blaszkowe)

Objawy chorobowe i przebieg zatrucia

- Nudności i wymioty
- Bóle brzucha
- Biegunka
- Odurzenie i uczucie osłabienia
- Osłabienie układu krążenia
- Lekkie napady pocenia się

UWAGA MOŻLIWOŚĆ ZAGROŻENIE ŻYCIA!!

GRUPA VI

Objawy zatrucia po 20 minutach

do 2 godzin

Substancja trująca bliżej niepoznana



Objawy chorobowe i przebieg zatrucia

- Nudności i wymioty
- Niekiedy biegunka
- Osłabienia
- Zaburzenie układu krążenia z sinicą wargi paznokci
- W ciężkich przypadkach niewydolność krążenia

UWAGA ZAGROŻENIE ŻYCIA !

Krowiak podwinięty – olszówka

UWAGA

W PIERWSZYCH OBJAWACH CHOROBYCH NATYCHMIAST ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA .

DO CHWILI PRZYBYCIA LEKARZA SPOWODOWAĆ WYMIOTY I NIE PIĆ ALKOHOLU!!

PRZESTRZEGA SIĘ PRZED SPOŻYWIANIEM W STANIE SUROWYM WSZYSTKICH GATUNKÓW GRZYBÓW

W TYM RÓWNIEŻ JADALNYCH!

Należy uważać aby nie pomylić grzybów jadalnych z trującymi ,są niemal identyczne czego przykładem są :

Kania

muchomor sromotnikowy



kurka



lisówka pomarańczowa



mleczaj rydz



mleczaj wełnianka



Smardz jadalny



pieprznica kasztanowata



gąska zielona



gąska siarkowa



borowik szlachetny



borowik purpurowy



Goryczak żółciowy



borowik grubo trzonowy (żółto pory)



Są to grzyby trujące, których spożycie może spowodować tragiczne w skutkach konsekwencje, czego przykładem są ostatnie przypadki zachorowań o których mówiono w mediach. Apele Inspektorów Sanitarnych nie przemawiają do Polaków.

Nasze prawo zezwala na sprzedaż grzybów jedynie z atestem , który można uzyskać od grzyboznawcy. Atest taki jest ważny jedynie 48godzin.

Jeśli więc mamy jakiegokolwiek wątpliwości co do zebranych ,lub zakupionych przez nas grzybów powinniśmy się udać do najbliższej Inspekcji Sanitarnej.

Dla mieszkańców powiatu wielickiego grzyboznawca znajduje w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie.