

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 1225/2023d z dnia 04.12.2023 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -179/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:

FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, tel.: 22 397 17 86,
www.fmcagro.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
(...)

SPOTLIGHT PLUS 060 EO

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin) - 60 g/l (6,4%).

**Zezwolenie MRiRW nr R-179/2012 z dnia 20.12.2012 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 1225/2023d z dnia 04.12.2023 r.**



UWAGA

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P391- Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

SPOTLIGHT PLUS 060 EO jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (woda w oleju), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego), niszczenia rozłogów i zwalczania chwastów dwuliściennych w międzyrzędziach w uprawie truskawki oraz niszczenia odrostów korzeniowych i zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie maliny, jeżyny, porzeczki czarnej i czerwonej, borówki wysokiej.

Spotlight Plus 060 EO stosuje się w celu:

1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez:
 - zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,
 - zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka,
 - zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.
2. Przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw.
3. Ułatwienia pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru ziemniaka.

Stosowanie Spotlight Plus 060 EO w roślinach jagodowych pozwala na:

1. Ograniczenie konkurencji chwastów dwuliściennych.
2. Kontrolę odrostów korzeniowych lub rozłogów.
3. Optymalizację ilości i jakości plonu roślin jagodowych.
4. Zmniejszenie nakładu pracy ręcznej lub mechanicznej w profesjonalnej produkcji roślin jagodowych.

DZIAŁANIE NA ROŚLINY

Środek zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), zwiększający wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji powodujący ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone części roślin, a proces zasychania (niszczenia) pędów rozpoczyna się od wierzchołków wzrostu rośliny.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna karfentrazon etylowy zaliczana jest do grupy 14 (dawnej grupy E).

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Ziemniak

Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.

Zabieg jednorazowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zabieg w dawkach dzielonych

Zabieg 1-szy

Maksymalne/zalecane dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.

Zabieg 2 – gi

Maksymalne/zalecane dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Termin niszczenia naci:

1. Termin fizjologiczny

Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin

stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.

2. Termin uwzględniający choroby wirusowe

Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych:

- odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka, odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka,
- odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin ziemniaka.

3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka

W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba przemieszczające się z naci do bulw.

Termin zbioru:

W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Truskawka

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w międzyrzędziach, niszczenie rozłogów.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

UWAGA:

Nie przekraczać ilości 0,8 l/ha środka w sezonie wegetacyjnym.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać po zbiorach owoców (lipiec-sierpień) drugi wykonać w następnym roku wczesną wiosną.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

1. Zabiegi wykonać w międzyrzędziach, opryskując bardzo dokładnie rosnące chwasty i rozłogi.
2. Nie dopuścić do opryskiwania liści i sąsiadujących roślin uprawnych z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń typowych dla herbicydów o działaniu kontaktowym.
3. Zaleca się stosowanie osłon zapobiegających znoszeniu cieczy użytkowej na liście i pędy truskawek.

Malina, jeżyna

Zwalczanie chwastów dwuliściennych, niszczenie odrostów korzeniowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

UWAGA:

Nie przekraczać ilości 1,6 l/ha środka w sezonie wegetacyjnym.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2.

Minimalny odstęp między zabiegami:7 dni.

Termin stosowania:

Zabiegi wykonywać między kwietniem a lipcem.

UWAGA:

1. Zabiegi wykonać w międzyrzędziach, opryskując bardzo dokładnie rosnące chwasty i odrosty korzeniowe.
2. Nie dopuścić do opryskiwania liści i sąsiadujących roślin uprawnych z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń typowych dla herbicydów o działaniu kontaktowym.
3. Zaleca się stosowanie osłon zapobiegających znoszeniu cieczy użytkowej na liście krzewów.

Porzeczką czarna, porzeczką czerwoną, borówką wysoką

Zwalczanie chwastów dwuliściennych, niszczenie odrostów korzeniowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

UWAGA:

Nie przekraczać ilości 1,6 l/ha środka w sezonie wegetacyjnym.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać w od fazy gdy pąki liściowe i grubsze od nich pąki kwiatowe są zamknięte i pokryte ciemnobrązowymi łuskami do fazy zakończenia nabrzmiewania pąków, brzegi łusek pąkowych jasno zabarwione (BBCH 01-03)

Drugi zabieg wykonać od fazy wytworzonych 60% owoców do fazy początku dojrzewania i wybawiania na typowy kolor owoców (BBCH 76-81).

UWAGA:

1. Zabiegi wykonać w międzyrzędziach, opryskując bardzo dokładnie rosnące chwasty i odrosty korzeniowe.
2. Nie dopuścić do opryskiwania liści i sąsiadujących roślin uprawnych z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń typowych dla herbicydów o działaniu kontaktowym.
3. Zaleca się stosowanie osłon zapobiegających znoszeniu cieczy użytkowej na liście krzewów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniak - Nie dotyczy.

Truskawka – 90 dni.

Malina, jeżyna, porzeczką czarna, porzeczką czerwoną, borówką wysoką – 21 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy.

1. Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przyspiesza działanie środka.
2. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach rannych).
3. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej nie dodawać środka zwilżającego.

Środka nie stosować:

- na mokre rośliny ziemniaka;
- gdy do 1 godziny po wykonaniu zabiegu spodziewany jest deszcz;

- podczas wysokich temperatur;
- gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są odsłonięte.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

- jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- pod zamknięciem, z dala od źródeł ciepła
- pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -