

Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 9/2021o z dnia 2.04.2021 r.  
Odnawiającej zezwolenie MRiRW nr R - 15/2010 z dnia 18.02.2010 r.

Posiadacz zezwolenia:

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa,  
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91, e - mail: infopl@evergreengarden.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

...


## TARCZNIK ULTRA PR

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

acetamipryd - (związek z grupy neonikotynoidów) – 4% (40 g/kg)

**Zezwolenie MRiRW nr R - 15/2010 z dnia 18.02.2010 r.**  
**odnowione decyzją MRiRW nr R – 9/2021o z dnia 2.04.2021 r.**

	
Uwaga	
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208	Zawiera żywice mocznikowo-formaldehdowe (CAS 9011-05-6, środek uwalniający formaldehyd). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
	Zebrać rozsypany produkt.

### OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie pałeczek do bezpośredniego stosowania, o działaniu żołądkowym przeznaczony do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych. W roślinie działa układowo.

Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikotynoidów (insektocydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholino (Ach) – wg IRAC grupa 4A).

### STOSOWANIE ŚRODKA

#### **Begonia zimowa**

*mszyca ziemniaczana*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 pałeczki na 1 l podłoża.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-2 pałeczki na 1 l podłoża.

Środek można dawkować w zależności od średnicy doniczki wypełnionej podłożem w następujący sposób:

średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka,

średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki,

średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki,

średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki.

Termin i sposób stosowania: środek można stosować przez cały rok, głównie podczas sadzenia lub przesadzania roślin, w czasie ich intensywnego wzrostu lub natychmiast po zaobserwowaniu wystąpienia szkodników lub pierwszych objawów ich żerowania, a także profilaktycznie w celu zapobiegania wystąpieniu szkodników.

Pałeczkę umieścić w pobliżu korzeni roślin wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie przykryta. Po zabiegu obficie podlać roślinę wodą.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w roku uprawy): 3

Zalecany odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 60 dni.

### **Gerbera**

*mączlik szklarniowy*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 pałeczki na 1 l podłoża.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-2 pałeczki na 1 l podłoża.

Środek można dawkować w zależności od średnicy doniczki wypełnionej podłożem w następujący sposób:

średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka,

średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki,

średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki,

średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki.

Termin i sposób stosowania: środek można stosować przez cały rok, głównie podczas sadzenia lub przesadzania roślin, w czasie ich intensywnego wzrostu lub natychmiast po zaobserwowaniu wystąpienia szkodników lub pierwszych objawów ich żerowania, a także profilaktycznie w celu zapobiegania wystąpieniu szkodników.

Pałeczkę umieścić w pobliżu korzeni roślin wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie przykryta. Po zabiegu obficie podlać roślinę wodą.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w roku uprawy): 3

Zalecany odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 60 dni.

### **Bluszcz**

*misecznik cytrusowiec*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 pałeczki na 1 l podłoża.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-2 pałeczki na 1 l podłoża.

Środek można dawkować w zależności od średnicy doniczki wypełnionej podłożem w następujący sposób:

średnica doniczki do 12 do 14 cm – 2 pałeczki,  
średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki,  
średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki.

Termin i sposób stosowania: środek można stosować przez cały rok, głównie podczas sadzenia lub przesadzania roślin, w czasie ich intensywnego wzrostu lub natychmiast po zaobserwowaniu wystąpienia szkodników lub pierwszych objawów ich żerowania, a także profilaktycznie w celu zapobiegania wystąpieniu szkodników.

Pałeczkę umieścić w pobliżu korzeni roślin wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie przykryta. Po zabiegu obficie podlać roślinę wodą.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w roku uprawy): 3  
Zalecany odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 60 dni.

### **Dracena obrzeźna**

*tarczownik czerniak*

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 pałeczka na 1 l podłoża.

Środek można dawkować w zależności od średnicy doniczki wypełnionej podłożem w następujący sposób:

średnica doniczki do 10 cm – 1 pałeczka,  
średnica doniczki do 11 do 14 cm – 2 pałeczki,  
średnica doniczki do 15 do 18 cm – 3 pałeczki,  
średnica doniczki powyżej 18 cm – 4 pałeczki.

Termin i sposób stosowania: środek można stosować przez cały rok, głównie podczas sadzenia lub przesadzania roślin, w czasie ich intensywnego wzrostu lub natychmiast po zaobserwowaniu wystąpienia szkodników lub pierwszych objawów ich żerowania, a także profilaktycznie w celu zapobiegania wystąpieniu szkodników.

Pałeczkę umieścić w pobliżu korzeni roślin wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie przykryta. Po zabiegu obficie podlać roślinę wodą.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (w roku uprawy): 3  
Zalecany odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 60 dni.

### **Uwaga:**

Po zastosowaniu pałeczek pierwsze efekty widoczne są: w przypadku zwalczania mszycy po 1 dniach, mączlika szklarniowego po 17 dniach, misecznika po 21 dniach, tarczownika po 28 dniach. Środek działa przez 5 do 10 tygodni. W przypadku dużej liczebności szkodnika objawy działania środka są widoczne od 5. tygodnia po zastosowaniu.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ**

1. W przypadku uprawy bluszczu nie stosować środka do doniczek o średnicy mniejszej niż 12 cm z uwagi na możliwość występowania fitotoksyczności.
2. Środek zawiera substancję czynną acetamipryd – związek z grupy pochodnych neonikotynoidów (insektycydy współdziałające z nikotynowymi receptorami acetylocholino (Ach) – wg IRAC grupa

4A). W celu zapobiegania rozwojowi odporności w populacjach szkodników należy przestrzegać następujących zasad:

- nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej liczby zabiegów w sezonie,
- w przypadku konieczności wykonania kolejnego zabiegu owadobójczego zaleca się zastosować środek zawierający substancję czynną, o innym mechanizmie działania (z innej grupy niż grupa 4A),
- rotację substancji czynnych pod względem mechanizmu działania zaleca się stosować w danym sezonie (roku uprawy) i pomiędzy kolejnymi sezonami wegetacyjnymi.

3. Przed zastosowaniem środka w każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie gerbery należy wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH**

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).

Pałeczkę umieścić wciskając ją w glebę tak, aby była całkowicie przykryta ziemią i niewidoczna dla dzieci.

Doniczki trzymać poza zasięgiem dzieci.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

### **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 0 °C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

### **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....