

# UDAR MÓZGU: DOBRE PRAKTYKI POSTĘPOWANIA Z PACJENTEM



## POSTĘPOWANIE DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH



### 1 | Zbierz wywiad medyczny

- ▶ ustal od kiedy występują objawy wskazujące na podejrzenie udaru mózgu lub
- ▶ ustal kiedy pacjent po raz ostatni widziany był bez tych objawów.

### 2 | Zadysponuj zespół ratownictwa medycznego

Do pacjenta z podejrzeniem udaru mózgu zadysponuj zespół ratownictwa medycznego, który najszybciej dotrze do miejsca zdarzenia. Rozważ zadysponowanie lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, gdy czas transportu drogą lotniczą jest krótszy od czasu transportu zespołem naziemnym.

JEŚLI OBJAWY, WSKAZUJĄCE NA UDAR MÓZGU, WYSTĘPUJĄ KRÓCEJ NIŻ 6 GODZIN, ZAWSZE NADAJ 1 KOD PILNOŚCI.

### 3 | Powiadom oddział udarowy

W przypadku transportu pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego do oddziału udarowego, zestaw trójpołączenie z lekarzem oddziału udarowego – tak, aby kierownik ZRM mógł przekazać kluczowe informacje. W przypadku braku możliwości zestawienia trójpołączenia z lekarzem oddziału udarowego, przełącz temu lekarzowi informacje otrzymane od ZRM.

## POSTĘPOWANIE ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

### 1 | Ustal dokładny czas od wystąpienia objawów udaru mózgu

- A – drogi oddechowe
- B – oddech
- C – krążenie
- D – ocena zaburzeń świadomości
- E – dalsze badanie pacjenta



### 2 | Wykonaj badanie ABCDE

- F – asymetria twarzy, niedowład lub porażenie mięśni po jednej stronie twarzy
- A – niedowład lub porażenie połowicze kończyn górnych lub dolnych
- S – zaburzenia mowy – mowa bełkotliwa, niezrozumiała, afazja
- T – czas od wystąpienia objawów

### 3 | Oceń stan neurologiczny w skali FAST:

## CZY U PACJENTA WYSTĘPUJE PODEJRZENIE UDARU MÓZGU

### TAK

- 1 Wykonaj dostęp dożylny (*i.v.*) lub doszpikowy (*i.o.*).
- 2 Oznacz poziom glikemii.
- 3 Chorym z poziomem  $SaO_2 < 94\%$  podaj donosowo tlen 4-6 l/min.
- 4 Jeśli pacjent ma napad drgawkowy, podaj standardowe leki przeciwdrgawkowe szybko działające.
- 5 Nie obniżaj ciśnienia tętniczego krwi bez konsultacji z lekarzem z oddziału udarowego.
- 6 Poinformuj dyspozytora medycznego o transporcie pacjenta do oddziału udarowego.
- 7 Pilnie przetransportuj pacjenta do szpitala z oddziałem udarowym. Rozważ wezwanie lotniczego zespołu ratownictwa medycznego, gdy czas transportu drogą lotniczą jest krótszy od czasu transportu zespołem naziemnym.

### NIE

- Jeśli nie wymaga pomocy medycznej pozostaw pacjenta na miejscu zdarzenia.
- Jeśli pacjent jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, przetransportuj go do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub do izby przyjęć.
- Jeśli pacjent jest w stanie, który wymaga transportu do wyspecjalizowanego szpitala, centrum urazowego dla dorosłych lub dla dzieci – przetransportuj pacjenta bezpośrednio do właściwej jednostki.

