

Załącznik do pozw. na handel równoległy nr R- 34/2014 h.r. z dnia 23.04. 2014 r.

**Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:**

Firma Handlowo-Usługowa Madez Mariusz Rudnicki, ul. Myśluborska 5a, 74-240 Lipiany

**Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:**

FPHU Pakmix Dorota Urban, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice,

**Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska**

## **D E L P H I N 69 W G**


### **Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych**

Zawartość substancji czynnych:

**dimetomorf** (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) **9% (90 g/kg)**

**mankozeb** (związek z grupy ditiokarbaminianów) **60% (600 g/kg)**.

**Pozwolenie MRiRW nr R - 34/2014 h.r. z dnia 23.04.2014 r.**



Szkodliwy



Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

### **I OPIS DZIAŁANIA**

Delphin 69 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul przeznaczonym do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie oraz roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

### **II ZASTOSOWANIE ŚRODKA**

#### **1. ZIEMNIAK**

*alternarioza*

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha**

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach. Wykonać od 3 do 8 zabiegów w sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8**

## **Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni**

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha (dostosować ilość wody do wielkości roślin).

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

### ***zaraza ziemniaka***

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha**

### Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:

- **na odmianach wczesnych** - w okresie zwierania się roślin w rzędach,
- **na odmianach późnych** - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych.

Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni zachowując krótszy odstęp między zabiegami w przypadku większego zagrożenia chorobą lub uprawiając odmiany ziemniaka podatne na zarazę. Środek stosować od 3 do 8 razy w sezonie wegetacyjnym.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 8**

**Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni**

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha (większą ilość wody stosować na plantacjach o dużej obsadzie roślin).

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

## **2. POMIDOR W GRUNCIE**

### ***zaraza ziemniaka***

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha**

### Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3**

**Odstęp między zabiegami: 7 dni**

### ***alternarioza***

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha**

### Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu choroby.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3**

**Odstęp między zabiegami: 7 dni**

### ***antraknoza owoców***

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha**

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha**

### Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać po wystąpieniu objawów choroby.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3**

**Odstęp między zabiegami: 7 dni**

Zalecana ilość wody: 700-800 l/ha (ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia).

### **3. POMIDOR POD OSŁONAMI**

#### ***zaraza ziemniaka***

**Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:** 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody).

**Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:** 0,3% (300 g środka w 100 litrach wody).

#### Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3**

**Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni**

Zalecana ilość wody: 120 l na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni uprawy.

### **4. OGÓREK W GRUNCIE**

#### ***mączniak rzekomy dyniowatych***

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:** 2 kg/ha

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:** 2 kg/ha

#### Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na plantacjach w danym rejonie.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3**

**Odstęp między zabiegami: 7 – 10 dni**

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

### **5. CEBULA**

#### ***mączniak rzekomy cebuli, alternarioza***

**Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:** 2 kg/ha

**Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:** 2 kg/ha

#### Termin stosowania:

Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej lub dymce w danym rejonie.

**Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3**

**Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni**

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

#### **Środek ogranicza występowanie alternariozy na cebuli.**

#### **Uwagi:**

Aby zapobiec zjawisku odporności, środek może być stosowany w ziemniaku maksymalnie 8 razy, a w pomidorze (w gruncie i pod osłonami), w ogórku (w gruncie) i cebuli maksymalnie 3 razy w sezonie wegetacyjnym. Zabiegi należy wykonywać przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

### **III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wleciu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

### **IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

#### **1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).**

Nie dotyczy

#### **2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)**

Nie dotyczy

#### **3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)**

Ogórek - **3 dni**

Pomidor - **3 dni**

Cebula - **14 dni**

Ziemniak – **7 dni**

#### **4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)**

Nie dotyczy

#### **5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO**

Nie dotyczy

#### **6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN**

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

#### **7. OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkami ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w odległości 3 m (ziemniak, pomidor, ogórek) lub 5 m (cebula) od zbiorników i cieków wodnych.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

## **V PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04

Kraków – (12) 411-99-99

Lublin – (81) 740-89-83

Łódź – (42) 657-99-00

Poznań – (61) 847-69-46

Rzeszów – (17) 866-40-25

Sosnowiec – (32) 266-11-45

Tarnów – (14) 631-54-09

Warszawa – (22) 619-66-54

Wrocław – (71) 343 30 08

## **VI PRZECHOWYWANIE**

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....

Nr partii - .....