

Posiadacz zezwolenia:

Mitsui Chemicals Agro, Inc., 1 – 19 – 1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio 103 – 0027, Japonia,
tel.: + 813 5290 2810, fax: + 813 3231 1183.

TACHIGAREN 70 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

hymeksazol (związek z grupy izoksazoli) – 700 g/kg (70 %)

Zezwolenie MRiRW nr R- 40/2017 z dnia 27.03.2017 r.



Niebezpieczeństwo

H228 - Substancja stała łatwopalna.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P261 - Unikać wdychania pyłu.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady /zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Tachigaren 70 WP jest fungicydem o działaniu układowym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczonym do ochrony przed chorobami siewek wywołanymi przez patogeny zasiedlające glebę. Zaprawianie przez otoczkowanie i inkrustowanie genetycznie jednokielkowych nasion buraka cukrowego odbywa się automatycznie w cyklu zamkniętym, zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia do otoczkowania i inkrustowania, w zakładach zajmujących się profesjonalnie otoczkowaniem materiału siewnego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy

zgorzel siewek buraka

Maksymalna zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

40 g / 1 jednostka siewna (100.000 nasion)

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

20 - 40 g / 1 jednostka siewna (100.000 nasion)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Maksymalna norma wysiewu nasion potraktowanych środkiem Tachigaren 70 WP wynosi: 1,5 j.s. na 1 ha

Należy ściśle przestrzegać zalecanej dawki środka.

Nasiona otoczkowane lub inkrustowane przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.

Inkrustowany otoczkowany materiał siewny może być wykorzystany wyłącznie do siewu.

Nasiona buraka zaprawione wysokimi dawkami środków grzybobójczych przeznaczone są wyłącznie do zasiewów punktowych.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawianie przez otoczkowanie i inkrustowanie genetycznie jednokiełkowych nasion buraka cukrowego odbywa się wyłącznie automatycznie w cyklu zamkniętym, zgodnie ze szczegółową instrukcją obsługi urządzenia do otoczkowania i inkrustowania.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAPRAWY I MYCIE APARATURY

Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy, ochronę dróg oddechowych oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin i odpowiednie obuwie (np. kalosze) podczas wszystkich czynności wykonywanych ze środkiem jak również z zaprawionymi nasionami.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Etykieta środka ochrony roślin Tachigaren 70 WS, załącznik do zezwolenia MRiRW

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:

- zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
- zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0°C - 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady /zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -